

sulfinyl-tolylsulfon. Die Verbindung vermag nun p-Toluolsulfinsäure gemäß III zu p-Toluolsulfonsäure zu oxydieren, wobei sie selbst in p-Toluol-thiosulfonsäure-p-tolylester übergeht. III verläuft etwa 20 mal schneller als die Disproportionierung der p-Toluolsulfinsäure. Die oxydierenden Eigenschaften von p-Toluolsulfinyl-tolylsulfon zeigen sich z. B. in der Ausscheidung von Jod aus einer Lösung von Kaliumjodid in Aceton sowie in der Oxydation des Tetraäthyl-p-phenylenamids zum Wursterschen Kation. Durch Permanganat wird es selbst zum Disulfon oxydiert, durch Jodwasserstoff wird es unter Freilegung von 3 J₂ quantitativ zum Disulfid reduziert.

Eingegangen am 19. März 1958 [Z 594]


¹⁾ C. Pauly u. R. Otto, Ber. dtsch. chem. Ges. 9, 1639 [1876]. —
²⁾ Ebenda 41, 3323 [1908].

Synthese des Triformylamino-methans und seine Umwandlung in 1,3,5-Triazin


Von Prof. Dr. H. BREDERECK, Dr. R. GOMPPER, Dr. H. REMPFER, Dipl.-Chem. H. KECK und Dipl.-Chem. K. KLEMM

Institut für Organische Chemie und Organisch-chemische Technologie der T. H. Stuttgart


Die Umsetzung bestimmter Halogenverbindungen mit Formamid bei 150 °C führt zu Formiaten gemäß¹⁾:



Wir fanden, daß sich Formamid vornehmlich zwischen 60 ° bis 80 °C mit Alkylierungs- und Aeylierungsmitteln nach folgendem Schema umsetzt:



Dabei entsteht neben Alkylformiaten, die im Vakuum abdestilliert werden, das Triformylamino-methan (Fp 164 °C). Besonders glatt und einfach verläuft die Synthese, wenn man Dialkylsulfate verwendet. Entsprechend dem Schema kann diese neue Verbindung auch aus Formaminoester-hydrochloriden und Formamidin-hydrochlorid mit Formamid dargestellt werden. Ihre Struktur ergibt sich u. a. daraus, daß sie, wenn auch in geringerer Ausbeute als bei dem genannten Verfahren, auch aus Orthoameisensäure-äthylester und Formamid unter Säurekatalyse zugänglich ist. Unter abgeänderten Versuchsbedingungen kann gemäß dem Schema die Reaktion auch auf der Stufe des Formamidinsalzes unterbrochen werden. Das Triformylamino-methan vereinigt in sich die Eigenschaften eines Orthoameisensäure-amids und eines „stabilisierten Formamidins“, in gewisser Hinsicht auch die einer „stabilisierten Blausäure“. Präparativ bedeutungsvoll ist, daß beim trockenen Erhitzen des Triformylamino-methans in guter Ausbeute 1,3,5-Triazin entsteht:



Derivate des Triformylamino-methans lassen sich z. B. durch Behandeln mit Carbonsäure-anhydriden in Gegenwart von etwas Pyridin gewinnen; wir haben so das Tri-acetamino- und das Tri-propionylamino-methan hergestellt.

Eingegangen am 31. März 1958 [Z 595]

¹⁾ H. Bredereck, R. Gompper u. G. Theilig, Chem. Ber. 87, 537 [1954].

Neue Synthese des Imidazols

Von Prof. Dr. H. BREDERECK, Dr. R. GOMPPER, cand. chem. R. BANGERT und Dipl.-Chem. H. HERLINGER
Institut für Organische Chemie und Organisch-chemische Technologie der T. H. Stuttgart

Wir berichteten über die Darstellung von Imidazol-Derivaten u. a. aus α -Halogenketonen und Formamid¹⁾. In Fortsetzung dieser Arbeiten konnten wir jetzt das Imidazol aus Halogen-acetaldehydacetalen (z. B. Bromacetalddehyd-glykolacetal) und Formamid unter gleichzeitigem Einleiten von Ammoniak in guter Ausbeute (60 %) darstellen. Da das Halogenacetal aus

Vinylacetat oder Paraldehyd mit Brom und Alkohol leicht und mit guter Ausbeute^{2, 3)} zugänglich ist, stellt diese Synthese die einfachste und ergiebigste Imidazol-Synthese dar.

Acetale höherer α -Bromaldehyde lieferten bei der Umsetzung mit Formamid neben anderen Produkten monosubstituierte Imidazole und Oxazole.

Eingegangen am 31. März 1958 [Z 596]


¹⁾ H. Bredereck u. G. Theilig, Chem. Ber. 86, 88 [1953]; H. Bredereck u. R. Gompper, ebenda 87, 700 [1954]. —²⁾ P. Z. Bedoukian, J. Amer. chem. Soc. 66, 651 [1944]. —³⁾ H. Baganz, Chem. Ber. 86, 151 [1953].

Über Mauerpfeffer-Alkaloide

Von Dr. B. FRANCK

Organisch-Chemisches Institut der Universität Göttingen

200 kg Mauerpfeffer (*Sedum acre L.*) wurden kurz nach der Blüte innerhalb zweier Tage nach der Ernte in Methanol zerkleinert. Chromatographische Untersuchung des Extraktes (n-Butanol, n-Dibutyläther, 1 proz. Ameisensäure = 2:1:3) auf Papier, das mit 0,5 m KH_2PO_4 imprägniert ist, zeigt vier Haupt- und sechs Nebenalkaloide. Adsorptionschromatographisch an Al_2O_3 wurden aus dem Rohalkaloid neben Sedamin (I)¹⁾ und Sedridin (II)²⁾ zwei neue tertiäre Alkaloide abgetrennt. Eines davon ist das gleichzeitig von C. Schöpf und R. Unger aus Mauerpfeffer isolierte Sedinin $\text{C}_{17}\text{H}_{25}\text{NO}_2$ ³⁾ von noch unbekannter Konstitution. Für das zweite neue Alkaloid wird der Name Sedinon vorgeschlagen.



Das IR-Spektrum des Sedinins enthält keine Carbonyl-Bande und nach dem Gehalt an aktivem Wasserstoff liegen die beiden Sauerstoffatome als Hydroxygruppen vor. KMnO_4 -Oxydation ergab Benzoësäure und Essigsäure. Katalytische Hydrierung führte zu einem Dihydrosedinin-hydrochlorid $\text{C}_{17}\text{H}_{27}\text{NO}_2 \cdot \text{HCl}$ vom Fp 168 °C, dem eine im Sedinin vorhandene IR-Bande bei 13,92 μ fehlt, die für cis- oder ringständige $-\text{CH}=\text{CH}-$ Gruppen typisch ist (CH-Wagging). Durch CrO_3 -Oxydation wurde daraus ein gesättigtes Diketon erhalten, das im IR-Spektrum mit synth. rac. 8-Methyl-10-phenyl-lobelidion (III) praktisch übereinstimmt. Diese Befunde sprechen für die Annahme, daß im Sedinin ein 8-Methyl-10-phenyl-lobelidol (III mit $-\text{OH}$ statt $=\text{O}$) mit einer Doppelbindung im Ring vorliegt.

Sedinon läßt sich von Sedamin, dem es nach Rs-Wert und chromatographischem Verhalten ähnlich ist, durch fraktionierte Kristallisation aus tiefesiedendem Petroläther abtrennen. Es krist. in 2–4 mm langen Nadeln vom Fp 93 °C. Die Analysenwerte stehen mit der Formel $\text{C}_{16}\text{H}_{23}\text{NO}_2$ (261,4) in Einklang. Das UV-Spektrum entspricht dem des Sedinins. Dagegen zeigt das IR-Spektrum eine intensive Carbonyl-Bande bei 5,81 μ . Im Rs-Wert stimmt Sedinon auch mit III überein.

Der Deutschen Forschungsgemeinschaft danke ich für eine Sachbeihilfe, den Farbenfabriken Bayer, Werk Elberfeld, für großzügige Unterstützung bei der Beschaffung von Pflanzenmaterial und bei der Extraktion.

Eingegangen am 27. März 1958 [Z 599]

¹⁾ L. Marion, Canad. J. Res. 23 B, 165 [1945]. —²⁾ C. Schöpf u. R. Unger, Experientia [Basel] 12, 19 [1956]; H. C. Beyerman u. Y. M. F. Müller, Recueil Trav. chim. Pays-Bas 74, 1568 [1955]. —³⁾ R. Unger, Dissert., Darmstadt 1957. — Prof. Dr. C. Schöpf bin ich für den Vergleich und für wertvolle Diskussion sehr zu Dank verpflichtet.

Redukton-thioäther

Von Prof. Dr. F. WEYGAND, Dipl.-Ing. H. TARNOW und Dr. H. J. BESTMANN

Organisch-chemisches Institut der Techn. Universität Berlin

Das aus 1-Diazo-3-methoxy-aceton (I) mit Äthylsulfenylchlorid (Äthylschwefelchlorid) erhältliche II liefert mit Natriumacetat in Eisessig-Essigsäureanhydrid kein einheitliches Reaktionsprodukt, wie der weite Siedebereich zeigt. Die Fraktion mit dem $K_{p,0,1}$ 96 °C gibt beim Erwärmen in wässriger Essigsäure Methoxy-methylglyoxal (VII) und dessen Diäthylmercaptal (VIII). Erwärmst man aber das Rohprodukt 2 Tage in 80 proz. Essigsäure auf 60 °C, so läßt sich daneben bei der Vakuumdestillation kristallines $\text{C}_5\text{H}_8\text{O}_2\text{S}$ (Fp 66 °C, Ausb. 9 %, ber. auf Diazoketon) isolieren, das