




Sek. Amine liefern in ätherischer Lösung bei Zimmertemperatur mit CH_3PBr_2 Methyl-bis-dialkylaminophosphine:



Entspr. reagieren Mercaptane und Alkohole. Durch Umsetzung von Alkyl-halogenphosphinen mit Ag-Salzen können die Halogen-Atome substituiert werden, z. B.



Mit Grignard-Verbindungen entstehen gemischte tert. Phosphine:



LiAlH_4 reduziert die Alkyl-halogenphosphine mit guten Ausbeuten zu den entsprechenden Phosphinen.


Eingegangen am 28. Juli 1959 [Z 814]

¹⁾ Das Verfahren ist zum Patent angemeldet. — ²⁾ Ludwig Maier, E. G. Rochow u. W. C. Fernellius, Abstracts of Papers 134th Meeting Amer. Chem. Soc., Chicago, Sept. 1958, S. 35 N; Ludwig Maier u. E. G. Rochow, J. Amer. chem. Soc., im Druck. — ³⁾ Siehe z. B. B. C. Saunders: Phosphorus and Fluorine. Cambridge University Press, 1957; G. Schrader: Die Entwicklung neuer Insektizide auf Grundlage organischer Fluor- und Phosphor-Verbindungen. Verlag Chemie, GmbH., Weinheim/Bergstr. 1952; A. I. Razumov, O. A. Mukhachewa, I. V. Zaikonnikova, N. N. Godovinka u. N. I. Rizpolozhenskii, Akad. Nauk SSSR, Trudy 1-oj Konferents. 1955, 205 (C. A. 52, 293 [1958]); F. W. Hoffmann u. T. R. Moore, J. Amer. chem. Soc. 80, 1150 [1958]; H. H. Schlör, E. Schegk u. G. Schrader, Deutsche Patentschriften F 23322 IVb/120, F 24304 IVb/12q und F 23321 IVb/12o [1957]. — ⁴⁾ Prozentzahlen beziehen sich auf die Zusammensetzung des destillierten Produkts.


Darstellung asymmetrischer Tetraalkyl-diphosphin-disulfide

Von Dr. LUDWIG MAIER
Monsanto Research SA., Zürich

Die Reaktion von CH_3MgBr mit PSCl_3 führt zum Tetramethyldiphosphin-disulfid¹⁾ der Struktur I²⁾.



Auch höhere Alkyl-magnesium-Verbindungen geben bei dieser Umsetzung Tetraalkyl-diphosphin-disulfide^{3, 4)} $\text{R}_2\text{P}(\text{S})-\text{P}(\text{S})\text{R}_2$. Bisher ist aber noch kein asymmetrisches Tetraalkyl-diphosphin-disulfid beschrieben worden. Wir fanden, daß bei der Umsetzung von $\text{CH}_3\text{P}(\text{S})\text{Br}_2$ ⁵⁾ mit Grignard-Verbindungen neben anderen Produkten, wie $\text{CH}_3\text{R}_2\text{PS}$ und $\text{CH}_3\text{RP}(\text{S})\text{OH}$, asymmetrische Tetraalkyl-diphosphindisulfide II gebildet werden, wobei das Racemat und die Meso-Form isoliert werden können. Die Formen unterscheiden sich in Lösungsverhältnissen und Schmelzpunkten.




R	Fp °C	
	A	B
C_5H_5	103–104	159–160
C_6H_5	92–94	155–156
C_6H_9	47–50	126–128
C_6H_5	145–146	206–208
$\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2$	183–184	noch nicht rein isoliert

Tabelle 1. Bisher dargestellte asymmetrische Tetraalkyl-diphosphin-disulfide

Nach vorläufigen Ergebnissen der Röntgenstrukturanalyse ist für $\text{R} = \text{C}_6\text{H}_5$ die höher schmelzende Form die Meso-Form⁶⁾. Versuche, das Racemat in die optischen Antipoden zu trennen, sind im Gange.



II läßt sich mit Zinkstaub zu den Tetraalkyl-diphosphinen reduzieren. Infolge einer Nebenreaktion sind die Ausbeuten aber ge-

ring. So konnte bei der Reduktion des Dimethyl-diäthyl-diphosphin-disulfids neben Dimethyl-diäthyl-diphosphin (III), Kp₇₆₀




54,5 °C⁷⁾, auch $(\text{H}_3\text{C})_2\text{PC}_2\text{H}_5$, $\text{P}(\text{CH}_3)_3$, $(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{PCH}_3$ und $\text{P}(\text{C}_2\text{H}_5)_3$ isoliert werden. Bessere Ergebnisse liefert die Reduktion mit tert. Phosphinen.

Alle anderen Reaktionen, die für die symmetrischen Tetraalkyldiphosphin-disulfide beschrieben sind⁴⁾, lassen sich auch mit den asymmetrischen Verbindungen ausführen. So gibt die Spaltung mit Brom Dialkyl-phosphor-thiobromide, z. B. Methyl-äthyl-phosphor-thiobromid (IV), Kp₁₀ 92–94 °C. Die Oxydation mit H_2O_2 , organischen Peroxyd-Verbindungen oder HgO liefert Dialkyl-phosphonsäuren, z. B. Methyl-butyl-phosphonsäure (V),



Kp 10^{-4} 142 °C, Fp 36 bis 37 °C. Durch Reduktion mit LiAlH_4 entstehen Dialkylphosphine, z. B. $\text{H}_3\text{C}-\text{P}(\text{H})-\text{C}_6\text{H}_5$, Kp₁₀ 55 bis 56 °C. Mit SOCl_2 bildet II quantitativ nach



Dialkyl-phosphoroxychloride (VI), z. B. $\text{H}_3\text{C}-\text{P}(\text{O})-\text{Cl}$ Kp₁₆ 110 bis 111 °C.

Eingegangen am 28. Juli 1959 [Z 815]


¹⁾ M. I. Kabatschnik u. J. S. Schepelewa, Nachr. Akad. Wiss. UdSSR 1949, 56; H. Reinhardt, D. Bianchi u. D. Mölle, Chem. Ber. 90, 1656 [1957]. — ²⁾ J. Goubeau, H. Reinhardt u. D. Bianchi, Z. physik. Chem. N. F. 12, 387 [1957]. — ³⁾ P. J. Christen, L. M. Van der Linde u. F. N. Hooge, Recueil Trav. chim. Pays-Bas 78, 161 [1959]. — ⁴⁾ K. Issleib u. A. Tzschach, Chem. Ber. 92, 704 [1959]; W. Kuchen u. H. Buchwald, diese Ztschr. 71, 162 [1959]. — ⁵⁾ Siehe vorsteh. Mitteilung. — ⁶⁾ P. J. Wheatley, Privatmitteilung. — ⁷⁾ Berechnet aus der Dampfdruckgleichung $\log p = -\frac{1571,3}{T} + 7,6767$.

Synthese des 5-Hydroxy-β-indolyl-acetaldehyds

Von Dr. B. MARCHAND und cand. chem. CH. STREFFER¹⁾

Radiologisches Institut der Universität Freiburg i. Brsg.

In der biologischen Oxydationsreihe: Tryptophan (I) → 5-Hydroxy-tryptophan (II) → 2-(5-Hydroxy-β-indolyl)äthylamin-(1) (Serotonin, III) → 5-Hydroxy-β-indolyl-acetaldehyd (IV) → 5-Hydroxy-β-indolyl-essigsäure (V) war der Aldehyd IV in wägbaren Mengen weder aus biologischem Material noch synthetisch dargestellt worden. Im Zusammenhang mit Arbeiten über die Strahlenschutzwirkung von Serotonin²⁾ haben wir IV synthetisiert.



Für die ersten Stufen, bis zur 5-Benzoxo-β-indolyl-essigsäure (VI), benutzten wir die bekannten Wege der Serotonin-Darstellung. VI wurde mit Diazomethan zum Methylester (VII) methyliert, dieser mit Hydrazin in das Benzoxo-acylhydrazid (VIII) und weiter durch Kondensation mit Acetylaceton in das entsprechende Acyl-dimethylpyrazol (IX; Fp 134 bis 135 °C) übergeführt. Durch katalytische Hydrierung ließ sich IX zum 5-Hydroxy-β-indolyl-acetyl-dimethylpyrazol (X; Fp 156 bis 157 °C) debenzylisieren, wobei der Pyrazol-Rest nicht angegriffen wurde. Reduktion von X mit Lithium-Aluminiumhydrid nach Ried und Königstein³⁾ lieferte den freien Aldehyd in ätherischer Lösung. Seine Isolierung gelang nicht, da er offenbar sehr leicht der Selbstkondensation unterliegt. Seine Bildung konnte durch Darstellung des 2,4-Dinitrophenyl-hydrazons (Fp 168 bis 169 °C) nachgewiesen werden.

Eingegangen am 10. August 1959 [Z 818]

¹⁾ Teil der Diplomarbeit. — ²⁾ H. Langendorff, H.-J. Melching u. H.-A. Ladner, Strahlentherapie 108, 2 [1959]. — ³⁾ W. Ried u. F. J. Königstein, diese Ztschr. 70, 165 [1958]; Liebigs Ann. Chem. 622, 37 [1959].