

einen Rückschritt, ohne die Schwierigkeiten mit Sicherheit zu be seitigen, da allen die natürliche Ausfällbarkeit und leichte Hydrolysebarkeit der Seife fehlt.

Auch ein Übergang auf Keryl-Typen des Alkylbenzolsulfonats, die besser biologisch abbaubar sind als die Tetrapropyl-Type, ist daher nicht ohne Risiko, zumal sie dafür andere biologisch wichtige Vorgänge stärker beeinflussen, was z. B. *Klust* und *Mann* dar gelegt haben.

Zuckerester kommen als Waschrohstoffe nicht in Frage, auch wenn die vorhandenen technischen Schwierigkeiten für ihre Groß produktion überwunden werden sollten.

H. J. HEINZ, Düsseldorf: *Arbeiten über den biologischen Abbau* *grenzflächenaktiver Stoffe*.

Die Schwierigkeiten mit den synthetischen waschaktiven Stoffen im Wasser und Abwasser werden dem verhältnismäßig schweren biologischen Abbau des Tetrapropyl-benzolsulfonates, das in den modernen Waschmitteln enthalten ist, zugeschrieben. Es sind zwar leichter abbaubare, waschaktive Substanzen bekannt, aber diese sind z. Z. nicht in den benötigten Mengen vorhanden. Versuchsergebnisse zeigen überdies, daß Tetrapropylbenzolsulfonat keineswegs so schwer abbaufähig ist wie bisher angenommen wurde. Es kann in normal betriebenen Kläranlagen bis zu 30 bis 50 % beseitigt werden. Bei bestimmten Änderungen der Betriebsweise von Belebtschlamm anlagen können sogar bis 80 % abgebaut werden. Voraussetzung dafür sind wesentlich höhere Schlamm trockenmassen (6000 mg/l und mehr), verteilte kontinuierliche Abwasserzuführung und Vermischung bei optimaler Aeration des ständig in hohem Aktivitätszustand gehaltenen, an die abzubauende Verbindung adaptierten Belebtschlammes.

In drei Laborversuchsanlagen konnten über mehrere Monate bei 20 mg Tetrapropyl-benzolsulfonat pro Liter im Zulauf bei Bilanzanalysen sehr regelmäßig Abbauraten von 80 % erhalten werden, selbst wenn die Schlamm trockenmasse nur noch bei Werten zwischen 3000–4000 mg/l lag. Es bestand dann kein wesentlicher Unterschied mehr zu den sog. besser abbaufähigen Vergleichs substanz.

H. SPOHN, Mannheim: *Über das Schaumverhalten von Haushaltswaschmitteln und Waschrohstoffen*.

Es wurde versucht, das Schaumbildungsvermögen von handels üblichen Waschmitteln als Haushaltswaschmittel und für Wä scherien in Abhängigkeit von deren Konzentration in Wasser verschiedener Härtegrade und in Flußwasser zu bestimmen. Es ergibt sich, daß bei Waschmitteln auf Basis Seifen + Synthetika das Schaumbildungsvermögen erwartungsgemäß eine starke Abhängigkeit von der Wasserhärte besitzt. Zur Erzielung stabiler Schäume sind von solchen Waschmitteln in Wasser mittlerer Härtegrade Mengen von 2 bis 3 g Waschmittel/l, entsprechend einer Detergentien-Konzentration von 500 bis 900 mg, erforderlich.

Bei den Waschmitteln auf rein synthetischer Basis ist das Schaumverhalten von der Wasserhärte praktisch unabhängig. Solche Produkte schäumen bereits bei niedrigen Konzentrationen. Eine eben merkliche Schaumbildung beginnt bei einer Konzentration von 13 mg Waschmittel/l, entsprechend einer Waschrohstoff-Konzentration von rd. 3 mg/l. Ein einigermaßen beständiger Schaum entsteht bei einer Waschmittel-Konzentration von 40 mg/l.

Ahnlich liegen die Verhältnisse bei reinen synthetischen Waschrohstoffen wie Tetrapropyl-benzolsulfonat (I): Beginnende Schaumbildung bei 3,5 bis 5 mg/l, beständiger, stabiler Schaum bei 7,5 bis 10 mg/l. Auch im Flußwasser (Rhein) zeigt I das gleiche Schaumverhalten. Bei den nichtionogenen Waschrohstoffen (Alkylphenol-äthylenoxyd-Addukt) ergibt sich überraschenderweise in niedrigem Konzentrationsbereich ein stärkeres Schaumvermögen als bei anionenaktiven Waschrohstoffen.

Die gegenwärtigen Haushaltswaschmittel und die zu ihrer Herstellung verwendeten Waschrohstoffe zeigen erst bei solchen Konzentrationen Schaumbildung, wie sie in normalen Haushaltsabwässern kaum je vorkommen können.

Die Analyse des bei den Neckar-Schleusen gebildeten Schaumes ergab:

ca. 55 % H_2O -unlös. organische Säuren bzw. deren Salze
15–17 % H_2O -lös. organische Säuren bzw. deren Salze
6 % Mineralöle u. dgl.
7 % Eiweißkörper
15 % anorganische Salze

Nach der angewandten analytischen Trennungsmethode und dem Schaumverhalten sind die vorliegenden schaumbildenden Stoffe, soweit sie als Waschrohstoffe anzusehen sind, in der Gruppe der wasserlöslichen organischen Verbindungen (15–17 %) zu finden. [VB 310]


Chemische Gesellschaft zu Heidelberg

am 23. Februar 1960

R. D. HAWORTH, Sheffield: *Neuere Untersuchungen über Gallotannine*.

Gallotannin-Extrakte enthalten häufig flavanoide Substanzen, die durch Gegenstromverteilung oder chromatographisch von der hauptsächlichen Tannin-Verbindung getrennt werden können. Dieser Hauptbestandteil entspricht dem von *E. Fischer* isolierten „Gallotannin“ (1908–1919). Es ist chromatographisch rein, und die aus den Gallen von *Rhus semialata* und *Quercus infectoria* sowie aus den Blättern von *Rhus coriaria* und *typhinus* erhaltenen Produkte sind chromatographisch identisch.

Das Enzym Tannase ist in Fraktionen zerlegt worden, von denen eine Esterase- aber keine Carbohydrase-Aktivität besitzt. Diese Fraktion spaltet Gallotannin in Glucose und Gallussäure, was bedeutet, daß die Vorstellung eines Polygalloyl-polysaccharides aufgegeben werden muß. Analysen des Gallotannins deuten auf die Struktur einer Octa- oder Nonagalloyl-glucose, doch zeigt die Gegenstromverteilung, daß Gallotannin heterogen ist und aus mehreren nahe miteinander verwandten Polygalloylglucose-Arten besteht, die sich sowohl in der Zahl als auch in der Stellung der Galloyl-Reste unterscheiden.



Synthetische Depside vom Typ (I) werden durch Methanol bei $pH = 5$ bis 6 zu 3,4-Dihydroxybenzoësäure-methylester und 4-Hydroxybenzoësäure-methylester gespalten. Unter ähnlichen Bedingungen entsteht aus Gallotannin Gallussäure-methylester. Als Zwischenprodukt konnte bei diesem Abbau m-Galloyl-gallussäure-methylester identifiziert werden, was darauf schließen läßt, daß Polygalloyl-Ketten aus mindestens drei Gallussäure-Resten an eine oder mehrere Hydroxyl-Gruppen des Glucose-Moleküls gebunden sind (II).

Tara-Tannin (aus *Caesalpinia spinosa*) enthält keine oder nur äußerst wenig Polygalloyl-glucosid. Hauptbestandteil ist ein unauflösbare Gemisch von Polygalloyl-chinasäuren, die durchschnittlich vier bis fünf Gallussäure-Reste/Molekül Chinasäure enthalten und sich nach Zahl und Stellung dieser Reste unterscheiden.


Vorläufige Untersuchungen über die Biogenese der Tannine er gaben qualitativ und quantitativ, daß 5-Dehydro-shikimisäure beim Schimmelpilz *Phycomyces blakesleeanus* die Vorstufe der Gallussäure ist. [VB 309]

Farbwerke Hoechst

am 9. März 1960

H. J. BESTMANN, München: *Aus der Chemie der Phosphazine und der Phosphinalkylene*.

Die im allgemeinen aus aliphatischen Diazo-Verbindungen und Triphenylphosphin erhältlichen Triphenylphosphazine lassen sich nach der von *L. Horner* und *H. Oediger*¹⁾ für die Synthese von Phosphiniminen angewandten Methode aus Hydrazonen und Triphenylphosphindibromid darstellen (mit *H. Fritzsche*).



Bei der Umsetzung der Triphenylphosphazine mit Aldehyden entstehen gemischte Azine neben Triphenyl-phosphinoxid.

¹⁾ Liebigs Ann. Chem. 627, 142 [1959].