

Auch Cyclohexylester enthaltende Cyclohexanol/Cyclohexanon-Gemische, wie sie z. B. bei der Luftoxydation von Cyclohexan anfallen, können nach diesem Verfahren zu Cyclohexanon dehydriert werden. Ein Gemisch aus 64,3 % Cyclohexanol, 28,3 % Cyclohexanon und 2,7 % Cyclohexylester (berechnet als Cyclohexylacetat) wurde bei 370 °C umgesetzt. Der Umsatz an Cyclohexanol und Cyclohexylester betrug 80,3 %. Die Cyclohexanon-Ausbeute, bezogen auf das durchgesetzte Gemisch, lag bei 97,8 Mol-%. Außerdem entstanden 0,36 Mol-% Cyclohexen. Der Restgehalt an Cyclohexylester (berechnet als Cyclohexylacetat) betrug 0,3 %.


Eingegangen am 1. Februar, ergänzt am 15. Februar 1965 [Z 918]

Uvanit, ein Uranylvanadat mit Schichtstruktur und innerkristallinem Quellungsvermögen

Von Prof. Dr. Armin Weiss und Dipl.-Chem. K. J. Hilke

Anorganisch-Chemisches Institut der Universität Heidelberg

Uvanit [1] ist ein seltenes, erdiges Mineral, dessen Strukturformel als



zu schreiben ist. Ob ein Teil des Wassers an das Trimetavanadat-Ion gebunden ist, konnte noch nicht sicher entschieden werden. Bei der in der Literatur [2] angegebenen Formel wurden die austauschfähigen Kationen als Verunreinigung vernachlässigt. Der anionische Schichtverband ist trigonal gebaut, mit einer Basiskante von 6,87 Å. Alkalische wässrige Lösungen zerstören ihn. Die Elementarzelle enthält nur eine Formeleinheit.

Die Kationen M^+ lassen sich gegen beliebige andere Kationen, auch primäre oder quartäre Alkylammonium-Ionen, austauschen. Die Menge beträgt ca. 177 mval pro 100 g des bei 110 °C getrockneten Minerals. Der Gehalt an Quellungs-

Trennung des 2-Hydroxypyridin-N-oxyd-Silicium-Komplexes in optische Antipoden — ein Beweis für die oktaedrische Koordination am Silicium

Von Dr. D. R. Harvey und Prof. Dr. Armin Weiss

Anorganisch-Chemisches Institut der Universität Heidelberg

Es gelang, die oktaedrische Koordination des Sauerstoffs um das Siliciumatom im Komplex mit 2-Hydroxypyridin-N-oxyd (HPNO) [1] durch die teilweise Aufspaltung in optische Antipoden zu beweisen. Die Spaltung gelang mit (–)-Dinatrium-dibenzoyl-L-tartrat (Na_2BT). Das (–)- $[Si(PNO)_3]HBT$ erwies sich als schwerer löslich als sein Diastereoisomeres und schied sich bevorzugt aus der wässrigen Lösung aus. Die gesättigte wässrige Lösung des schwerlöslichen Diastereomeren ergab eine negative Drehung, die bei der Zersetzung des Komplexes auf einen konstanten, schwach negativen Wert absank, der dem Gehalt an (–)-Monohydrogen-dibenzoyl-L-tartrat-Anionen entsprach. Das Filtrat der Fällungsreaktion zeigte eine hohe positive Drehung, die bei $pH = 1,8$ bis 1,9 und 25 °C nach einer Reaktion 1. Ordnung mit einer Halbwertszeit von ca. 70 min abklangt.

2-Hydroxypyridin-N-oxyd erinnert somit an Acetylaceton, das ebenfalls einen kationischen Komplex mit einer oktaedrischen Koordination um das Siliciumatom liefert [2]. Während jedoch HPNO den Komplex mit Kieselsäure sogar in wässriger Lösung bildet, reagiert Acetylaceton im wässrigen Milieu nicht.

Wie Acetylaceton bildet HPNO auch mit anderen Elementen Komplexe, z. B. $Al(PNO)_3$, $Fe(PNO)_3$ oder $[Sn(PNO)_3]_2SnCl_6$ (vgl. auch [3, 4]).

Eingegangen am 17. Februar 1965 [Z 920]

[1] A. Weiss u. D. R. Harvey, Angew. Chem. 76, 818 (1964); Angew. Chem. internat. Edit. 3, 698 (1964).

[2] S. K. Dhar, V. Doron u. S. Kirschner, J. Amer. chem. Soc. 81, 6372 (1959).

[3] G. T. Newbold u. F. S. Spring, J. chem. Soc. (London) 1948, 1864; E. Shaw, J. Amer. chem. Soc. 71, 67 (1949).

[4] A. Albert, C. W. Rees u. A. J. H. Tomlinson, Recueil Trav. chim. Pays-Bas 75, 819 (1956).

M^+	H_2O	Äthylen-glykol	Schichtabstand [Å] unter				n-Alkylamin mit gleicher C-Zahl wie Kation
			Nitro-äthan	n-Octanol	n-Decanol		
Li^+	14,8	11,1					mit beliebigen n-Alkylaminen
Na^+	13,3	9,6					uneinheitliche Abstände.
Mg^{2+}	15,0	12,6					Bei Gegenwart von H_2O partieller Ionenaustausch.
UO_2^{2+}	15,1	13,6					
$n-C_8H_{17}NH_3^+$		22,2	23,8	26,8	32,3		28,6
$n-C_{10}H_{21}NH_3^+$	nicht	24,1	25,0	28,4	33,8		33,1
$n-C_{12}H_{25}NH_3^+$	sicher	26,0	26,6	30,2	35,6		40,0
$n-C_{14}H_{29}NH_3^+$	zu	27,3	28,1	32,0	37,4		45,7
$n-C_{18}H_{37}NH_3^+$	messen	32,2	30,3	34,1	40,0		54,0
$n-C_{16}H_{33}N(CH_3)_3^+$		30,3	31,0	35,1	41,8		—

wasser und damit auch die Schichtabstände werden vom Wasserdampf-Partialdruck und von der Art der austauschfähigen gebundenen Kationen beeinflußt. Mit Alkylammonium-Ionen tritt eine Quellung auch mit vielen polaren organischen Lösungsmitteln auf (Tabelle). Die Basiskantenlänge bleibt unverändert.

Die Röntgendiagramme liefern nur hk-Banden, die zu größeren Beugungswinkeln hin ausgeschwängt sind (Kreuzgitterinterferenzen), und (001)-Interferenzen.

Eingegangen am 21. Januar 1965 [Z 901]

[1] Das untersuchte Präparat wurde uns freundlicherweise vom US National Museum, Washington, Smithsonian Institute, zur Verfügung gestellt. Es ist dort unter der Katalog-Nr. 102765 registriert.

[2] F. L. Hess u. W. T. Schaller, Washington Acad. Sci. J. 4, 576 (1914).

Synthese von Cyclo-tri-L-prolyl, einem Cyclo-tripeptid mit neungliedrigem Ring [1]

Von Priv.-Doz. Dr. M. Rothe und Dipl. Chem. K.-D. Steffen, mitbearbeitet von Dr. Ilse Rothe

Organisch-Chemisches Institut der Universität Mainz

Die Synthese von Cyclo-tripeptiden ist bisher nicht gelungen, da lineare Tripeptide beim Ringschluß unter Dimerisierung in Cyclo-hexapeptide mit spannungsfreiem, 18-gliedrigem Ring übergehen.

Wir erhielten bei der Cyclisierung von Tri-L-prolin [Halbhydrat, $F_p = 125-130$ °C (Zers.)] nach der p-Nitrophenylester- oder Phosphit-Methode [2] bei gleichzeitiger Anwendung des Verdünnungsprinzips mit 88 % Ausbeute das gut kristallisierte, sublimierbare Cyclo-tri-L-prolyl in dünnenschichtchromatogra-