

Ausbeute 4-Aminopyrimidin-5-thiocarboxamid entsteht, das sich allerdings nicht cyclisieren lässt, vermutlich weil die Nucleophilie der 4-Aminogruppe zu gering ist.

Eingegangen am 23. November 1965 [Z 138]

[1] Diese Arbeiten wurden gefördert durch die Smith Kline and French Laboratories und durch das National Cancer Institute, National Institutes of Health, Public Health Service (Grant CA-02551).

[2] Ein Gemisch aus gleichen Volumeneilen Äthylorthoformiat und Essigsäureanhydrid ist das Reagens der Wahl für die Bildung von Äthoxymethylenaminen. In einigen Fällen (3-Amino-4-cyanpyrazol, 2-Aminobenzonitril, 1-Amino-2-cyancyclopent-1-en) kann jedoch die Acetylierung der Aminogruppe überwiegen, und dann empfiehlt es sich, Äthylorthoformiat allein zu verwenden.

[3] C. C. Cheng u. R. K. Robins, J. org. Chemistry 21, 1240 (1956).

Einstufige Synthese anellierter Pyrimidindithione^[1]


Von Prof. Dr. E. C. Taylor, Dr. R. N. Warrener und Dr. A. McKillop

Department of Chemistry, Princeton University, Princeton, N.J. (USA)

Bei der Umsetzung aromatischer oder heterocyclischer o-Aminonitrile mit CS₂ in Pyridin entstehen anellierte Pyrimidindithione (Dimercaptopyrimidine).

3,0 g 2-Aminobenzonitril, 10 ml CS₂ und 10 ml Pyridin werden 2 Std. unter Rückfluß gekocht. Beim Verdünnen des An satzes mit Methanol scheidet sich 1*H*,3*H*-Chinazolin-2,4-dithion ab. In gleicher Weise wurden die anderen in der Tabelle genannten Verbindungen erhalten.

Um den Verlauf dieser Umsetzung zu klären, kochten wir 5 g 3-Amino-4-cyanpyrazol (1), 50 ml CS₂ und 50 ml Pyridin 1 Std. unter Rückfluß. 10,25 g eines gelben, kristallinen Pyri-



o-Aminonitril	Pyrimidindithion	Rkt.-Dauer [Std.]	Ausb. [%]	Fp [°C]
2-Aminobenzonitril	1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> -Chinazolin-2,4-dithion	2	97	335–338(Z)
2-Amino-5-methoxybenzonitril	6-Methoxy-1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> -chinazolin-2,4-dithion	1	99	350–352(Z)
2-Amino-5-piperidinobenzonitril	6-Piperidino-1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> -chinazolin-2,4-dithion	1	95	282–285(Z)
2-Amino-5-brombenzonitril	6-Brom-1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> -chinazolin-2,4-dithion	68	92	> 360
4-Amino-5-cyanpyrimidin	1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> -Pyrimido[4,5- <i>d</i>]pyrimidin-2,4-dithion	10	68	> 360
5-Amino-4-cyan-1-methylpyrazol	1-Methyl-5 <i>H</i> ,7 <i>H</i> -pyrazolo-[3,4- <i>d</i>]pyrimidin-4,6-dithion	52	87	321–323(Z)
5-Amino-4-cyan-1-phenylpyrazol	1-Phenyl-5 <i>H</i> ,7 <i>H</i> -pyrazolo-[3,4- <i>d</i>]pyrimidin-4,6-dithion	115	97	248–260(Z)
3-Amino-4-cyanpyrazol	5 <i>H</i> ,7 <i>H</i> -Pyrazolo[3,4- <i>d</i>]pyrimidin-4,6-dithion	1	81	> 360

diniumsalzes schieden sich ab, aus dem bei der Behandlung mit kalter verdünnter HCl die Verbindung (2) entstand. Beweisend für die Struktur dieser Verbindung ist die Elementaranalyse, das Fehlen einer CN-Bande und die Anwesenheit einer kräftigen NH-Bande im IR-Spektrum, das UV-Spektrum (λ_{max} in Äthanol: 237, 262, 311, 382 m μ , $\epsilon = 11160$, 12270, 11340 und 2950) und die quantitativ verlaufende Umlagerung zu (3) bei der Behandlung mit 1 N NaOH.

Eingegangen am 23. November 1965 [Z 139]


[1] Diese Arbeiten wurden gefördert von den Smith Kline and French Laboratories sowie vom National Cancer Institute, National Institutes of Health, Public Health Service (Grant CA-02551).

N-Acy- und N-Sulfonylcarbamidsäureazide

Von Doz. Dr. R. Neidlein


Pharmazeutisch-Chemisches Institut der Universität Marburg

Die unseres Wissens bisher unbekannten N-Acy carbamidsäureazide (2) erhielten wir durch Addition äquimolarer Mengen Stickstoffwasserstoffssäure an N-Acylisocyanate (1)^[1] unter Rühren und Kühlen in benzolischer Lösung.




	R =	Fp [°C (Zers.)]	Ausb. [%]
(2a)	C ₆ H ₅ —	111–112	94
(2b)	p-Cl-C ₆ H ₄ —	141–142	88
(2c)	p-CH ₃ -C ₆ H ₄ —	112–113	89
(2d)	o-CH ₃ O-C ₆ H ₄ —	115–116	93
(2e)	m-CH ₃ O-C ₆ H ₄ —	109–110	94

Analog bildet sich aus p-Toluolsulfonylisocyanat (3)^[2] und Stickstoffwasserstoffssäure p-Toluolsulfonylcarbamidsäureazid (4).



Die Strukturen der Verbindungen sind durch die Spektren gesichert. N-Acy carbamidsäureazide zeigen bei 2155 bis 2165 cm⁻¹, N-Sulfonylcarbamidsäureazide bei 2193 cm⁻¹ die für die N₃-Gruppe charakteristische Absorptionsbande. Im ¹H-NMR-Spektrum von (2a) erscheint das Signal des NH-Protons bei 9,34 ppm sowie ein Multiplett der aromatischen Protonen mit Zentrum bei 7,6 ppm (gemessen in Deuteriochloroform). Die Verbindungen sind bei Raumtemperatur beständig, und es sind befriedigende Elementaranalysen erhalten worden.

N-Acy carbamidsäureazide (2) reagieren mit äquimolaren Mengen Triphenylphosphin in wasserfreiem Tetrahydrofuran unter Abspaltung von 1 Mol Stickstoff zu (N'-Acy carbamoyl)-imino-triphenylphosphoranen (5):



	R =	Fp [°C]	Ausb. [%]
(5a)	C ₆ H ₅ —	153–154	89
(5b)	p-Cl-C ₆ H ₄ —	175–176	82
(5c)	p-CH ₃ -C ₆ H ₄ —	180–181	92
(5d)	o-CH ₃ O-C ₆ H ₄ —	59–60	87
(5e)	m-CH ₃ O-C ₆ H ₄ —	170–171	94