


R	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	(2), Fp [°C]	(2), Ausb. [%]
C <sub>12</sub> H <sub>25</sub>	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	172	64,6
C <sub>14</sub> H <sub>29</sub>	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	174	79
C <sub>16</sub> H <sub>33</sub>	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	175,5	70,3
C <sub>18</sub> H <sub>37</sub>	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	178	79
Benzyl	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	174	29,3
Cyclohexyl	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	155	36,6
Phenyl	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	[a]	45
	Pyridyl		194,5–195	54,4
	Chinolyl		182 [b]	61,3

[a] Sehr heftige Reaktion; das gelbliche, ölige Reaktionsprodukt konnte nicht befriedigend rein erhalten werden. [b] Mit 1 Mol Kristallwasser.



R	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>	(3), Fp [°C]	(3), Ausb. [%]
C <sub>12</sub> H <sub>25</sub>	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	—C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> —	Paste	86
C <sub>12</sub> H <sub>25</sub>	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	—CH <sub>2</sub> —o—C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> —	42—43	71
Pyridyl			—CH(C <sub>10</sub> H <sub>21</sub> ) <sub>2</sub> —(CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> —	149	69,4

Die Reaktion ist nicht auf das 1,3-Propansulton beschränkt. Auch Butansulton, o-Toluolsulton (Sulton der 2-Hydroxy-methylbenzolsulfonsäure) und Tridecansulton (aus der Reaktion von  $\text{SO}_3$  mit 1-Tridecen [2]) reagieren mit Aminoxiden zu O-Alkylierungsprodukten vom Typ (3).

Die O-Alkylhydroxylammonium-sulfobetaine sind in neutrale und saurer wäßriger Lösung stabil. Im alkalischen Medium (pH = 12) werden sie an der N—O-Bindung in tertiäres Amin und  $\omega$ -Formylsulfonat gespalten.

Eingegangen am 7. Februar 1966 [Z 151]

[1] W. R. Dunstan u. E. Goulding, J. chem. Soc. (London) 75, 792 (1899); J. Meisenheimer, Liebigs Ann. Chem. 397, 273 (1913); K. B. Augustinsson u. H. Hasselquist, Acta chem. scand. 15, 817 (1961).

[2] DAS 1159430 (9. Aug. 1962), Henkel & Cie., Erf.: *H. Baumann, W. Stein u. M. Voß*.

## Ein Wirbeltierhormon als Wehrstoff des Gelbrandkäfers (*Dytiscus marginalis*)<sup>[1]</sup>


Von Prof. Dr. H. Schildknecht, Dipl.-Chem. R. Siewert und  
Dr. U. Maschwitz

Organisch-Chemisches Institut der Universität Heidelberg

Mehr als für die Funktion und die Inhaltsstoffe der Pygidialblasen von Dytisciden hat man sich für die Wehrdrüsen im Brustabschnitt interessiert. 1721 hat *Frisch* richtig vermutet, daß das giftige Sekret dieses Wasserkäfers als „garstige Tropfen einen Hecht oder ein anderes Tier innen quäle könnte“, das den Käfer verschluckt.

Schon beim bloßen Festhalten, aber sicher bei leichtem Druck gegen den Kopf gibt der Käfer die Drüsensäfte nach außen ab. Aus dem in Kapillaren aufgenommenen Sekret kristallisiert der Wirkstoff manchmal aus ( $F_p = 135-140^\circ\text{C}$ ); besser isoliert man ihn dünnenschichtchromatographisch. Durch das UV-Absorptionsmaximum bei  $241\text{ m}\mu$ , die Reaktion mit 2,4-Dinitrophenylhydrazin<sup>[2]</sup>, die IR-Ab-

sorptionsbande einer  $\nu\text{-C}=\text{C-Schwingung}$  bei  $1613\text{ cm}^{-1}$  und die Bande der  $\nu\text{-C=O-Schwingung}$  bei  $1668\text{ cm}^{-1}$  war ein  $\alpha,\beta$ -ungesättigtes Keton angezeigt. Eine zweite Ketogruppe gab sich durch die Absorption bei  $1693\text{ cm}^{-1}$  zu erkennen. Entscheidend für die Charakterisierung des Wirkstoffes als ein Steroid-Diketon war dann die cirkulardichroitische Absorption mit den Extrema bei  $283$  und  $321\text{ m}\mu$ . Entsprechend den Angaben in der Literatur<sup>[3]</sup> durften wir daraus sowohl auf ein  $\Delta^4$ -3-Ketosteroid als auch auf ein 20-Ketosteroid schließen. Die Ketogruppe C-20 aber konnte auf Grund ihrer IR-Absorption bei  $1693\text{ cm}^{-1}$  mit einer durch die Absorption bei  $3475\text{ cm}^{-1}$  nachgewiesenen OH-Gruppe verbrückt sein. Alle diese Befunde sprachen für das  $\Delta^4$ -Pregnen-3,20-dion-21-ol (1) (11-Desoxycorticosteron oder Cortexon).



Sowohl das handelsübliche Cortexon als auch das daraus leicht darstellbare Acetat stimmten in allen physikalischen Eigenschaften mit dem Naturstoff und dessen Acetat überein. Die physiologischen Eigenschaften des Cortexons erklären die Wirkung des Dytiscuswirkstoffes, denn Cortexon ist ein mineralocorticoides Hormon der Wirbeltiere. Da der Käfer bis zu 0,4 mg Hormon speichert – eine Menge, die sonst nur aus den Nebennieren von über tausend Rindern isoliert werden kann<sup>[4]</sup> – muß er den Natrium-Kalium-Haushalt von Wirbeltieren empfindlich stören. So beobachteten wir, in Übereinstimmung mit den Ergebnissen von Blunck<sup>[5]</sup>, nach Verabreichung des Dytiscussekretes oder von Cortexonlösungen per os an Hechte und Forellen oft schon nach kurzer Zeit eine tiefe Narkose. Auf den Käfer selbst hat das Cortexon als artfremdes Hormon keine Wirkung.

Eingegangen am 22. Februar 1966 [Z 168]

- [1] XXI. Mitteilung über Arthropoden-Abwehrstoffe. — XX. Mitteilung: *H. Schildknecht* u. *W. F. Wenneis*, *Z. Naturforsch.*, im Druck. Die Untersuchungen wurden ermöglicht durch Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Der Firma Merck, Darmstadt, danken wir für die kostenlose Überlassung von Cortexon. Herr *H. Schäflein* (Straubing) hat uns durch die Überlassung von Gelbrandkäfern geholfen.

[2] *H. Schildknecht* u. *K. Holoubek*, *Angew. Chem.* 71, 524 (1959).

[3] *L. Velluz* u. *M. Legrand*, *Angew. Chem.* 73, 603 (1961).

[4] *L. F. Fieser* u. *M. Fieser*: *Organische Chemie*. Verlag Chemie, Weinheim 1965, S. 1623.

[5] *H. Blunck*, *Z. wiss. Zool.* 117, 205 (1917).

## Nucleotidsequenzen zweier serinspezifischer Transfer-Ribonucleinsäuren [1,2]

Von Prof. H. G. Zachau, Dr. D. Dürring und Dr. H. Feldmann

Institut für Genetik der Universität Köln

Institut für Genetik der Universität Köln

Untersuchungen zur Struktur von Transfer-Ribonucleinsäuren (tRNS<sup>[3]</sup>) gipfelten kürzlich in der Aufklärung der Nucleotidsequenz einer alaninspezifischen tRNS<sup>[4]</sup>. Wir haben erstmals die Nucleotidsequenzen von *zwei* für eine Aminosäure spezifischen tRNS, nämlich der beiden hauptsächlichen serinspezifischen tRNS aus Brauereihefe, ermittelt und können damit die zweite vollständige Nucleotidsequenz bekanntgeben. Wichtige Beiträge zu dieser Arbeit wurden in früheren Stadien von *E. Melchers*<sup>[5]</sup> und *W. Karau*<sup>[6]</sup> geleistet.

Die Serin-tRNAs wurden durch Spaltung mit Pancreas- und T<sub>1</sub>-RNase in Oligonucleotide zerlegt, deren Strukturen durch weiteren enzymatischen Abbau aufgeklärt wurden. Durch Vergleich der Oligonucleotide der beiden Spaltserien konnten