


- [1] C. Schleyerbach, Dissertation, Technische Hochschule Hannover, 1965.
 [2] F. Umland, B. K. Poddar u. H. Stegemeyer, Z. analyt. Chem. 216, 125 (1966).
 [3] F. Umland u. B. K. Poddar, Angew. Chem. 77, 1012 (1965); Angew. Chem. internat. Edit. 4, 958 (1965).

Biosynthese des 5,6-Dimethylbenzimidazols^[1]

Von P. Renz und K. Reinhold^[*]

Propionibacterium shermanii bildet anaerob in Gegenwart von Kobalt Cobinamid. Aerob entsteht daraus bei Zugabe von Milchsäure größtenteils Cobalamin [α -(5,6-Dimethylbenzimidazolyl)-cobamid]. Da Milchsäure von Propionsäurebakterien in Acetyl-Coenzym A umgewandelt wird^[2], war es möglich, bei Einsatz von [2-¹⁴C]-Natrium-D,L-lactat und [2,3-¹⁴C₂]-Natrium-D,L-lactat zu prüfen, ob das im Cobalamin enthaltene 5,6-Dimethylbenzimidazol (1) wie zahlreiche andere aromatische Verbindungen aus Acetat-Einheiten entsteht.



Hierzu wurde Bakterienfeuchtmasse von *P. shermanii* nach zweitägigem anaeroben Wachstum durch Zentrifugieren gewonnen. 10×25 g der Masse (Cobinamidgehalt 1–2 mg/25 g) wurden in 400 ml steriles 1/15 M Phosphatpuffer (pH = 7,0) aufgeschlämmt und mit 8 ml einer 50-proz. Natriumlactat-Lösung versetzt, die 10 μ C radioaktives Lactat enthielt. Die Ansätze wurden 50 Std. bei 30°C geschüttelt. Nach Isolierung des entstandenen Vitamins B₁₂ wurde dieses mit HCl^[3] zu (1) abgebaut. Zur Bestimmung der Radioaktivität in den beiden Methylgruppen und in C-5 und C-6 wurde (1) nach *Kuhn-Roth*^[4] abgebaut, wobei 1 Molekül (1) 2 Moleküle Essigsäure lieferte. Die Essigsäure wurde weiter zu Methylamin und CO₂ abgebaut^[5]. Da beim Kuhn-Roth-Abbau die restlichen C-Atome zu CO₂ oxidiert werden, mußte (1) für die Radioaktivitätsbestimmung in C-4, C-7, C-8 und C-9 in Anlehnung an eine Methode von Efros et al.^[6] zu Imidazol-4,5-dicarbonsäure abgebaut und diese zu Imidazol decarbo-

Radioaktivitätsverteilung im markierten 5,6-Dimethylbenzimidazol (Impulse min⁻¹ mmol⁻¹).

	[2- ¹⁴ C]-Lactat	[2,3- ¹⁴ C ₂]-Lactat
(1)	4230	12000
CH ₃	146	1170
C-5 + C-6	730	1170
C-4 + C-7	0	2090
C-2 + C-8 + C-9	1022	730
Summe	1898	5160
% der eingesetzten Radioaktivität	45 [a]	43 [a]

[a] Daß in den Bruchstücken nur 45 bzw. 43 % der eingesetzten Radioaktivität gefunden wurde, ist darauf zurückzuführen, daß (1) in Äthanol/Dioxan/Toluol, die Bruchstücke in Hyamine/Toluol gemessen wurden.

xyliert werden^[7]. Die Radioaktivität in C-2 wurde nicht getrennt ermittelt.

Die Tabelle zeigt, daß bei Einsatz von [2-¹⁴C]-Lactat überwiegend C-2, C-5, C-6, C-8 und C-9 markiert sind, bei Einsatz von [2,3-¹⁴C₂]-Lactat dagegen sämtliche Bruchstücke. Diese Verteilung der Radioaktivität ist die gleiche, die *Plaut*^[8] für den Dimethylbenzolring des Riboflavins nachgewiesen hat. Der Aufbau dieses Rings erfolgt demnach bei Riboflavin und Cobalamin nach dem gleichen Schema.

Eingegangen am 5. Oktober 1967 [Z 632]

[*] Dr. P. Renz und Dipl.-Chem. K. Reinhold
 Institut für Biochemie und Biotechnologie der Universität
 7 Stuttgart N, Azenbergstraße 14

[1] IX. Mitteilung über Biosynthesen in der Cobalamin-Reihe. – VIII. Mitteilung: P. Renz, Angew. Chem. 79, 311 (1967); Angew. Chem. internat. Edit. 6, 368 (1967).

[2] S. H. G. Allen, R. W. Kellermeyer, R. L. Stjernholm u. H. G. Wood, J. Bacteriol. 87, 171 (1964).

[3] N. G. Brink u. K. Folkers, J. Amer. chem. Soc. 72, 4442 (1950).

[4] R. Kuhn u. H. Roth, Ber. dtsch. chem. Ges. 66, 1274 (1933).

[5] E. F. Phares, Arch. Biochem. Biophysics 33, 17 (1951).

[6] L. S. Efros, N. V. Khromov, L. R. Davidenkov u. M. M. Nedel, Ž. obšč. Chim. 26, 455 (1956); Chem. Abstr. 50, 13881f (1956).

[7] H. R. Snyder, R. G. Handrick u. L. A. Brooks, Org. Syntheses 22, 65 (1942).

[8] G. W. E. Plaut, J. biol. Chemistry 211, 111 (1954).

VERSAMMLUNGSBERICHTE

Neues über Darstellung und Eigenschaften anorganischer Halogenamine

Von J. Jander^[*]

Anorganische Halogenamine können neuerdings durch Disproportionierung der Halogene mit Ammoniak bei etwa -75°C gewonnen werden. Das hierbei u.a. isolierte rotbraune NJ_3NH_3 zeigt tatsächlich die dieser Formel entsprechende Struktur und ist nicht etwa ein 1:1-Addukt aus NHJ_2 und NH_2J . Dies folgt aus der – analytisch wie IR-spektroskopisch untersuchten – Behandlung mit Pyridin oder Chinolin, bei welcher das Ammoniak durch die N-Basen ersetzt wird, ohne daß die NJ_3 -Baueinheit zerstört wird^[1]. Die von Bärnighausen und Hartl^[2] röntgenographisch aufgeklärte Struktur zeigt NJ_4 -Tetraeder, die über gemeinsame Jodatome zu Ketten verknüpft sind. An einem Jodatom jedes NJ_4 -Tetraeders ist zusätzlich ein Ammoniakmolekül durch eine Charge-Transfer-Bindung gebunden.

Um den Zerfall des Monochloramins NH_2Cl über das instabile Imen oder Nitren NH aufzuklären, wurde Mono-

chloramin bei -75°C in Dimethyl-2-buten mit Phenyllithium umgesetzt. Zwar lief die erwartete α -Eliminierung in guter Ausbeute an, wie an dem gebildeten Benzol erkannt werden konnte, doch entstanden nur 3% 2,2,3,3-Tetramethylaziridin. Während der Reaktion fiel ein weißer Niederschlag aus, der beim Erwärmen N_2 und NH_3 entwickelte. Der Niederschlag ist bei -75°C etwas ätherlöslich; die klaren Lösungen scheiden beim Erwärmen LiCl aus. Weitere Untersuchungen müssen zeigen, ob es sich bei dem Niederschlag um LiNHCl oder ein Folgeprodukt dieser Verbindung handelt^[3].

[GDCh-Ortsverband Hamburg,
 am 25. Juli 1967]

[VB 95]

[*] Prof. Dr. J. Jander
 Institut für Anorganische Chemie der Freien Universität
 1 Berlin 33, Fabeckstraße 34/36

[1] J. Jander u. L. Bayersdorfer, Z. anorg. allg. Chem., im Druck.

[2] H. Hartl, H. Bärnighausen u. J. Jander, Z. anorg. allg. Chem., im Druck.

[3] J. Fischer, Dissertation, T.H. München 1967.