

CAS-Registry-Nummern:
 (±)-(1a): 7699-51-0 / (±)-(1b): 26642-09-1 / (−)-(1b): 4747-98-2 /
 (±)-(2a): 5630-11-5 / (±)-(2b): 39945-40-9 / (±)-(2b)·HBr: 63569-46-0 /
 (+)-(2b): 21848-62-4 / (+)-(2b)·HBr: 63599-49-5 /
 (+)-(2b)·N-Acetyl derivat: 14787-63-4 / (±)-(3a): 57236-98-3 /
 (±)-(3a)·HBr: 63569-47-1 / (±)-(3a)·Acetat: 63598-88-9 /
 (±)-(3b): 63569-48-2 / (±)-(3b)·HBr: 63569-49-3 /
 (+)-(3b)·Trifluoracetat: 63569-50-6 /
 (±)-(3b)·O,N-Diacetyl derivat: 63569-51-7 / (+)-(3b): 63598-89-0 /
 (+)-(3b)·O,N-Diacetyl derivat: 63598-90-3 / (+)-(4): 475-81-0 /
 (−)-(4): 38325-02-9 / (+)-(5): 38764-84-0 / (+)-(5)·Acetat: 38726-63-5 /
 (−)-(5): 63598-91-4 / (+)-(6): 63598-92-5 / VOF₃: 13709-31-4.

[1] S. M. Kupchan, Om P. Dhingra, Chang-Kyu Kim, J. Org. Chem. 41, 4049 (1976); zit. Lit.

[2] Alle synthetisierten Verbindungen wurden durch IR, NMR, MS und teilweise durch Elementaranalysen charakterisiert. Ausbeuten beziehen sich auf kristallisierte Produkte.

[3] a) (+)-Catalin (+)-(5) wurde aus *Glaucium Flavum Cr. var. Vestitum* isoliert; I. Ribas, J. Sueiras, L. Castedo, Tetrahedron Lett. 1972, 2033.
 b) Unsere Catalin-Synthese wurde Anfang 1974 durchgeführt; J. Hartenstein, G. Satzinger, DOS 2625116.1 (1976), Gödecke AG; c) D. Hoshino, H. Hara, M. Ogawa, B. Umezawa haben einen anderen synthetischen Zugang zu (±)-Catalin mitgeteilt: J. Chem. Soc. Chem. Commun. 1975, 306; Chem. Pharm. Bull. (Japan) 23, 2578 (1975); d) Acetylierung lieferte das Acetat vom Fp=169–170°C. Für (+)-Catalinacetat wurde Fp=91–92°C angegeben [3a].

[4] H. Corrodi, E. Hardegg, Helv. Chim. Acta 39, 889 (1956).

[5] a) M. Tomita, S.-T. Lu, S.-J. Wang, C.-H. Lee, H.-T. Shih, Yakugaku Zasshi 88, 1143 (1968); Chem. Abstr. 70, 48850b (1969); b) C. Casagrande, G. Ferrari, Farmaco 25, 442 (1970).

[6] L. Castedo, R. Suan, A. Mourino, Heterocycles 3, 449 (1975).


Bis(trifluormethyl)disulfanoxid, CF₃S(O)SCF₃ [**]

Von Willy Gombler^[*]

Organyl-disulfanoxide (-thiosulfinate) des Typs RS(O)SR sind in großer Vielfalt bekannt^[1], und seit der Entdeckung und Charakterisierung von Allicin (R=Allyl), dem antibakteriell wirkenden Inhaltsstoff des Knoblauchs, wurden auch von Dialkyldisulfanoxiden biologische Aktivitäten nachgewiesen^[1]. Alle bisher synthetisierten Disulfanoxide (und Trisulfanoxide^[2]) disproportionieren bei Raumtemperatur:



Disulfanoxide mit Perhalogenalkylgruppen konnten bis jetzt noch nicht synthetisiert werden. So ergab die Umsetzung von Hg(SCF₃)₂ mit CF₃S(O)Cl nicht die erwünschte Verbindung CF₃S(O)SCF₃ (1), sondern CF₃SSCF₃ (2) und CF₃S(O)₂SCF₃ (3)^[3]. Zum gleichen Ergebnis führten die Hydrolyse von CF₃SCl (4)^[4] und die Reaktion von (4) mit Ag₂O oder Ag₂CO₃^[5]. Auch neueste Versuche, Verbindungen mit der CF₃S(O)S-Gruppe darzustellen, blieben erfolglos^[6]. Es gelang nun, (1) durch Hydrolyse von CF₃SF₂SCF₃ (5)^[7] bei tiefer Temperatur in Gegenwart von KF als HF-Fänger mit 65 % Ausbeute zu erhalten.



Das Produkt (1) ist bei Raumtemperatur unerwartet stabil (nach 3 Monaten in einem abgeschmolzenen Glasröhren unverändert!), eine farblose Flüssigkeit, die bei -138°C erstarrt und deren Dampfdrücke durch log p [Torr] = 7.5462

[*] Dr. W. Gombler

Lehrstuhl für Anorganische Chemie II der Universität
 Postfach 102148, D-4630 Bochum 1

[**] Die experimentellen Arbeiten wurden an den Universitäten in Saarbrücken und Bochum durchgeführt.

– 1605.98/T wiedergegeben werden (extrapolierter Siedepunkt 71.1°C, $\Delta H_v = 30.8 \text{ kJ/mol}$, $\Delta S_v(K_p) = 89.2 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$). (1) disproportioniert in Gegenwart von HF innerhalb von 1–2 Tagen, bei Anwesenheit von (4) innerhalb von etwa 3 Wochen vollständig in (2) und (3). Mit der Kenntnis von (1) konnte nun NMR-spektroskopisch festgestellt werden, daß auch die Hydrolyse von (4) sowie die Reaktion von (4) mit Ag₂CO₃ über (1) verlaufen. (1) wurde spektroskopisch (Tabellen 1 und 2) und durch Molekulargewichtsbestimmung charakterisiert. Die Spektren wurden mit denen von (3) verglichen.

Tabelle 1. ¹⁹F- und ¹³C-NMR-Daten von (1), (2) und (3).

	313.7	336.9	311.3	327.1	314.9
CF ₃ SSCFCF ₃	1.5	1.5	1.5	5 [a]	5 [a]
$\delta(^{19}\text{F})$	-46.6	-69.5	-34.2	-76.8 [a]	-36.3 [a]
$\delta(^{13}\text{C})$	128.5	125.6	129.7	116.0	122.9

Positive δ -Werte: Tieffeldverschiebung gegen CFCI₃ bzw. TMS, J in Hz.
 [a] R. A. De Marco, J. M. Shreeve, Inorg. Chem. 12, 1896 (1973).

Tabelle 2. IR-, Raman- und massenspektroskopische Daten von (1).

IR (cm ⁻¹ , rel. Int.):	1220 vs, 1180 vs, 1105 vs, 758 m, 454 m.
Raman (cm ⁻¹ , rel. Int.):	1190–1250 br (3), 1173 (22), 1117 (12), 765 (59), 752 (28), 579 (6), 562 (5), 548 (1), 485 (36), 460 (30), 364 (18), 329 (14), 262 (65), 250 (100), 207 (10), 148 (32), 119 (5).
MS (m/e, rel. Int.):	218 (2), 202 (4), 149 (24), 133 (3), 117 (7), 114 (2), 101 (2), 98 (2), 82 (100), 76 (14), 69 (92), 64 (16), 63 (21), 60 (12), 50 (6), 48 (10), 44 (10), 31 (6).

Arbeitsvorschrift

In einer Hochvakuumapparatur wird zunächst (5) frisch präpariert. Dazu werden 8 g (59 mmol) (4) mit 50 g (210 mmol) wasserfreiem HgF₂ umgesetzt^[7]. Das Rohprodukt wird bei -78°C von (4) und (2) durch Abpumpen weitgehend befreit, bis es fast farblos ist (NMR-spektroskopische Identifizierung von (5) bei -50°C!). Die Ausbeute an (5) mit nichtstörender Verunreinigung von restlichem (2) beträgt ca. 5.8 g (24 mmol). Nun wird (5), das nicht wärmer als -30°C werden darf, mittels flüssigen Stickstoffs in ein Kondensationsgefäß [K] aus Glas kondensiert, in dem sich 6 g (103 mmol) fein gemahlenes KF und 0.6 g (33 mmol) H₂O befinden. [K] wird 24 h bei -50°C gehalten und gelegentlich leicht geschüttelt. Dann wird mitentstandenes SiF₄ bei -78°C abgepumpt, [K] wieder auf -50°C erwärmt und das Produkt bis auf den Überschub an H₂O in ein Vorratsgefäß (-196°C) kondensiert. Die weitgehende Abtrennung von leichter flüchtigem (2) gelingt durch diskontinuierliches Abziehen der Gasphase, die sich bei -50°C mit der Flüssigkeit im Gleichgewicht befindet (Partialdrücke bei -50°C: (2) 10.7, (1) 0.2 Torr).

Ausbeute an (1) 3.4 g (65 %), Verunreinigung an (2) 5 %. Molekulargewichtsbestimmung nach *Regnault*: 217.5 (ber. 218.1).

Eingegangen am 11. Juli 1977 [Z 785]

CAS-Registry-Nummern:

(1): 63548-94-7 / (2): 372-64-5 / (3): 358-15-6 / (4): 421-17-0 /
 (5): 26391-89-9.

- [1] Vgl. E. Block, J. O'Connor, J. Am. Chem. Soc. 96, 3921 (1974); zit. Lit.
 [2] R. Steudel, J. Latte, Chem. Ber. 110, 423 (1977).
 [3] D. T. Sauer, J. M. Shreeve, Inorg. Chem. 10, 358 (1971).
 [4] R. N. Haszeldine, J. M. Kidd, J. Chem. Soc. 1955, 2901.
 [5] A. Haas, M. E. Peach, Z. Anorg. Allg. Chem. 338, 299 (1965).
 [6] C. A. Burton, J. M. Shreeve, Inorg. Chem. 16, 1039 (1977).
 [7] F. Seel, W. Gombler, Angew. Chem. 81, 789 (1969); Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 8, 773 (1969); W. Gombler, Z. Anorg. Allg. Chem., im Druck.