

ben. Der Herausgeber, *Jaime Eyzaguirre*, hat Vorträge, die 1984 in Chile auf einer Tagung gehalten wurden, redigiert und 1987 in Buchform veröffentlicht. Der Tagungsband ist eine lehrbuchhafte Beschreibung bekannter Techniken anhand von ausgewählten Beispielen geworden. Leider ist er nach dem heutigen Stand der Technik schon teilweise veraltet. So fehlen alle DNA-Techniken zur Proteinmodifikation, insbesondere die in-vitro-Mutagenese sowie als analytische Technik die zweidimensionale NMR-Spektroskopie. Das Buch leidet somit unter einem typischen Fehler vieler Kongressbände: Sie sind bei Erscheinen schon teilweise überholt. Zu empfehlen ist der Band für fortgeschrittene Studenten der Biochemie und für Einsteiger in das Gebiet der Proteine. Das Buch ist verständlich geschrieben, gut illustriert und redigiert, und einzelne Kapitel referieren Literatur bis 1986. Zusammengefaßt: Leichte Kost für Neueinsteiger in die Proteinchemie, für Adepten des Fachs nichts Neues.

Hans-Günter Gassen [NB 864]
Institut für Organische Chemie
und Biochemie

der Technischen Hochschule Darmstadt

The Practice of Enantiomer Separation by Capillary Gas Chromatography. Von *W. A. König*. Hüthig, Heidelberg 1987. XII, 104 S., geb. DM 48.00. – ISBN 3-7785-1324-9

Die Trennung und die quantitative Erfassung von Enantiomeren ist auch heute noch ein schwieriges Problem. Ein Verfahren, das in den letzten Jahren zur Lösung dieser Aufgabe entwickelt und vervollkommen wurde, ist die Kapillargaschromatographie. Der derzeitige Kenntnisstand auf diesem Gebiet ist in dem Büchlein von *König* umfassend und leicht verständlich dargelegt.

In einem allgemeinen Teil wird zunächst das Prinzip der Methode, die Herstellung chiraler Säulenbelegmaterialien und die Präparierung der Säulen sowie – soweit bekannt – der Mechanismus der Enantiomerentrennung auf Säulen mit chiralen Belegmaterialien behandelt. Da meist sehr polare Verbindungen getrennt werden müssen, ist in fast allen Fällen eine Derivatisierung der Probe nötig. Die Methoden hierfür und die Schwierigkeiten sind in den folgenden Abschnitten dargelegt und vielfach mit Beispielen aus der Praxis belegt. Detaillierte Vorschriften zur Herstellung der Derivate ergänzen die einzelnen Kapitel. In weiteren Abschnitten werden andere chromatographische Methoden der Enantiomerentrennung und -bestimmung diskutiert, so die Trennung durch Bildung von Metallkomplexen und die Enantiomerentrennung durch Darstellung diastereomerer Derivate, so daß man insgesamt einen guten Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten der Enantiomerentrennung erhält und befähigt wird, das für ein anstehendes Problem beste Verfahren auszuwählen.

König hat mit dieser Darstellung der gaschromatographischen Enantiomerentrennung dem Praktiker eine wertvolle Arbeitshilfe gegeben. Eine klare und wertende Diskussion der einzelnen Methoden, das Herausstellen von Vor- und Nachteilen besprochener Verfahren sowie der Praxisbezug sind hervorstechende Eigenschaften dieses Buches, dessen Lektüre Freude bereitet. Wer immer mit der Trennung chiraler Stoffe und ihrer Bestimmung zu tun hat, wird aus diesem Buch Nutzen ziehen.

Gerhard Spiteller [NB 841]
Laboratorium für Organische Chemie I
der Universität Bayreuth

Regulation of Secondary Metabolite Formation. Proceedings of the Sixteenth Workshop Conference Hoechst, Gracht Castle, 12–16 May 1985. Herausgegeben von *H. Kleinkauf, H. von Döhren, H. Dornauer und G. Nese-mann*. VCH Verlagsgesellschaft, Weinheim 1986, XX, 402 S., geb. DM 108.00. – ISBN 3-527-26475-2

Zu den klassischen Aufgaben der Biotechnologie gehört die Gewinnung von Antibiotica mit Hilfe von Mikroorganismen. Durch Mutation und Selektion wurden Stämme mit optimaler Produktion (Hochleistungsstämmen) gewonnen. Dieses empirische Verfahren wurde angewendet, ohne daß man die Zusammenhänge zwischen der Bildung von Sekundärmetaboliten und Regulationsvorgängen kannte. Verblüffend ist, daß trotz der großen Bedeutung der Antibiotica die genetische Instabilität von Hochleistungsstämmen noch nicht aufgeklärt ist. Es fehlt auch weitgehend die Brücke zwischen dem Wissen über die Biosynthese von Antibiotica und dem über die Genetik der Antibioticabildner. Selbst der Mechanismus der Mutagenese ist bei der für die Praxis so wichtigen Gruppe der *Streptomyces* bei weitem nicht so gut verstanden wie beim klassischen Objekt *Escherichia coli*.

So erscheint es sehr sinnvoll, daß bei der 16. Arbeitstagung der Farbwerke Hoechst die Mikrobiologie mit dem aktuellen Thema der Regulation des Sekundärstoffwechsels zu Wort kam. Dabei wurden zwanzig Vorträge von namhaften Experten aus der ganzen Welt gehalten. *Bu Lock* berichtete über genetische Aspekte der Mycotoxinbildung. *Hopwood* gab einen Überblick über die wichtigen und intensiven Untersuchungen seiner Gruppe zur Genetik der *Streptomyces*. Von *Esser* wurden Probleme der Genetik von Eukaryoten-Zellen diskutiert. Mehrere Beiträge behandelten das wichtige Thema der Penicillin- und Cephalosporinbildung: *Demain* z. B. erläuterte die negative Beeinflussung der Cephamycinbildung in *Streptomyces clavuligerus* durch Ammoniumsalze. Die Alkaloidbiosynthese in Pilzen war Thema der Vorträge von *Luckner* und von *Keller*. *Kleinkauf* und von *Döhren* schilderten Probleme der Synthese von Peptid-Antibiotica durch enzymatische Systeme. *Vining* berichtete über die Arbeiten seiner Gruppe zur genetischen und physiologischen Kontrolle der Chloramphenicol-Biosynthese. *Gräfe* setzte sich in seinem Beitrag intensiv mit der Beeinflussung der Bildung von Sekundärmetaboliten in *Streptomyces* durch den A-Faktor (2-(6'-Methylheptanoyl)-3-hydroxymethyl-4-butanolid) und seine Derivate auseinander. *Béhal* behandelte sowohl die Regulation der Tetracyclin-Biosynthese als auch in einem zweiten Beitrag allgemein die Regulation von Bildung und Aktivität der Enzyme des Sekundärstoffwechsels. Die Synthese dieser Enzyme beginnt im allgemeinen erst nach dem Verbrauch leicht verwertbarer Quellen für Kohlenstoff, Stickstoff und Phosphor und wird in einigen Fällen durch das Endprodukt gehemmt. *Floss* berichtete über die Biosynthese einiger Polyketid-Antibiotika. *Ōmura* gab einen interessanten Einblick in die Tylosin-Biosynthese und ihre Regulation durch Ammoniumsalze und Phosphate. Auch ein Vertreter der Pflanzenbiochemie kam zu Wort: *Grisebach* lieferte einen Beitrag zur Induktion und Regulation der Phytoalexin-Synthese in Sojabohnen.

In einer abschließenden Diskussion, die *Hans von Döhren* zusammenfaßte, wurden Definitionen gebracht und ungelöste Fragen herausgearbeitet. Eine Schlußbetrachtung von *Demain* gipfelte in mehreren Postulaten: Wenn die Genetik die Rätsel des Sekundärmetabolismus lösen soll, wäre es wünschenswert, 1. daß in der Industrie genetische Systeme für praktisch wichtige Organismen entwickelt werden, 2. daß man sich im akademischen Bereich auf