


Angewandte Chemie

Eine Zeitschrift der Gesellschaft Deutscher Chemiker



[www.angewandte.de](http://www angewandte de)

2009–121/41



Eine oxidative Umlagerung ...

... und eine Fischer-Indolsynthese sind die Schlüsselschritte der ersten Totalsynthese von (+)-Haplophytin, die von H. Tokuyama, T. Fukuyama und Mitarbeitern in ihrer Zuschrift auf S. 7736 ff. beschrieben wird. Das Titelbild zeigt eine Aufnahme von *Haplophyton cimicidum* (T. Beth Kinsey, www.fireflyflrest.com/flowers), der Quelle von (+)-Haplophytin.

Innentitelbild

**Hirofumi Ueda, Hitoshi Satoh, Koji Matsumoto, Kenji Sugimoto,
Tohru Fukuyama* und Hidetoshi Tokuyama***

Eine oxidative Umlagerung und eine Fischer-Indolsynthese sind die Schlüsselschritte der ersten Totalsynthese von (+)-Haplophytin, die von H. Tokuyama, T. Fukuyama und Mitarbeitern in ihrer Zuschrift auf S. 7736 ff. beschrieben wird. Das Titelbild zeigt eine Aufnahme von *Haplophyton cimicidum* (T. Beth Kinsey, www.fireflyflrest.com/flowers), der Quelle von (+)-Haplophytin.

