

Angewandte Chemie

Eine Zeitschrift der Gesellschaft Deutscher Chemiker



Chemie

[www.angewandte.de](http://www angewandte de)

2011–123/29



Die grundlegende Reaktivität ...

... der Benzoleinheit kann durch Metall-(C-C)-Wechselwirkungen verändert werden, die sich aus dem Verkapseln des spezifischen Donorzentrums (CCNNN) im Porphyrinkern von Palladium(II)-*p*-benzylporphyrin ergeben. In ihrer Zuschrift auf S. 6717 ff. schildern L. Latos-Grażyński et al. die bemerkenswerte, einfache Pd^{II} -vermittelte Ringverengung von *p*-Phenylen zu Cyclopentadien unter Bildung von 21-Carabaporphyrin-Komplexen.

Innentitelbild

Bartosz Szyszko, Lechosław Latos-Grażyński* und
Ludmiła Szterenberg

Die grundlegende Reaktivität der Benzoleinheit kann durch Metall…(C-C)-Wechselwirkungen verändert werden, die sich aus dem Verkapseln des spezifischen Donorzentrums (CCNNN) im Porphyinkern von Palladium(II)-*p*-benzoporphyrin ergeben. In ihrer Zuschrift auf S. 6717 ff. schildern L. Latos-Grażyński et al. die bemerkenswerte, einfache Pd^{II}-vermittelte Ringverengung von *p*-Phenylen zu Cyclopentadien unter Bildung von 21-Carbaporphyrin-Komplexen.

