

## Angewandte Berichtigung

Eine Untersuchung der NMR-Spektren für die Produkte der Reduktion des Se-Phenyl-1-methoxybicyclo[2.2.2]oct-5-en-2-carboselenoats **5f** überzeugte die Autoren dieser Zuschrift, dass die Reaktion nicht das erwartete 1-Methoxybicyclo-[2.2.2]oct-2-en **6f** in 67% Ausbeute liefert, wie in Tabelle 1, Zeile **f**, beschrieben. Statt dessen werden drei Hauptprodukte in einer gemeinsamen Ausbeute von 67% erhalten: Neben dem erwarteten **6f** (16%) entstehen zwei Produkte über die Umlagerung eines Cyclopropylcarbinylradikals, nämlich das *endo*-Isomer (57%) und das *exo*-Isomer (27%) von 2-Methoxybicyclo[3.2.1]oct-6-en; zuerst genanntes ist eine bekannte Verbindung.<sup>[1]</sup>

Se-Phenyl Prop-2-eneselenoate: An Ethylene Equivalent for Diels–Alder Reactions

M. E. Jung,\* F. Perez, C. F. Regan,  
S. W. Yi, Q. Perron ————— **2114–2116**

*Angew. Chem.* **2013**, *125*

DOI: 10.1002/ange.201208294

[1] a) M. A. Battiste, J. M. Coxon, A. J. Jones, R. W. King, G. W. Simpson, P. J. Steel, *Tetrahedron Lett.* **1983**, *24*, 307–310; b) M. A. Battiste, J. M. Coxon, G. W. Simpson, P. J. Steel, A. J. Jones, *Tetrahedron* **1984**, *40*, 3137–44.