

CONTRIBUTORS TO THIS ISSUE

Ando K.	115	Matsuda Y.	115
Barracclough P.	81	Matsuda Y.	121
Bolofo M. L.	81	Matsumura S.	105
Capobianco J. O.	97	McLaughlin J. L.	25
Cedergren R.	61	McNeill A.	81
Chao J.-F.	25	Miller M. J.	43
Cheng C.-Y.	73	Nakamura T.	105
Côté J.	55	Nakanishi S.	115
Crescenzi F.	131	Nakata M.	105
De Luca C.	131	Nielsen P. E.	5
Ghosh M.	43	Nishimura Y.	91
Giles H.	81	Ochiai K.	115
Gillam J.	81	Ohmi I.	49
Goldman R. C.	97	Ohta K.	105
Griffin J. H.	97	O'Regan M.	131
Haraguchi H.	49	Ratcliffe G. S.	33
Harris C. J.	81	Rieser M. J.	25
Horwell D. C.	33	Robertson A. D.	81
Howson W.	33	Rose I. C.	97
Hsin L.-W.	73	Satoh T.	91
Hyrup B.	5	Sharpe B. A.	97
Jong T.-T.	73	Shen G.-J.	131
Kano T.	105	Singh S. M.	55
Katahira R.	121	Stepney R. J.	81
Kelly M. G.	81	Takeuchi T.	91
Kinoshita M.	105	Tao P.-L.	73
Kondo S.	91	Toki S.	115
Kubo I.	49	Toshima K.	105
Kudo T.	91	Whittle B. J. R.	81
Labrie F.	55	Willems H. M. G.	33
Lansing M.	131	Wong C.-H.	131
Laplante S.	55	Yamasaki M.	115
Leclerc F.	61	Yamasaki M.	121
Lee R. C.	97	Yano K.	115
Leff P.	81	Yoshida M.	115
Li X.	55	Yoshida M.	121
Lin Y.-P.	73	Zakula D.	97
Llorente B.	61	Zeng L.	25
Luu-The V.	55	Zhao G.-X.	25
Martini I.	131		

Cover Photograph, *Bioorganic & Medicinal Chemistry*

1996: Stereo view of the D₂O solution structure of d(CGCA3T3GCG) complexed by the Zn(II) tren-microgonotropen-6b. Complex formation involves sequence specific occupancy of minor and major grooves and a distortion angle comparable to that observed for *cis* platin dsDNA complexes (~36°). See Blaskó, A.; Browne, K. A.; Bruce, T. C. *Bioorg. Med. Chem.* **1995**, *3*, 631–646.