

CONTRIBUTORS TO THIS ISSUE

Allen M.	639	Konings D. A. M.	717
Ator M.	639	Kyle D. J.	631
Baumbach G. A.	699	Labbe J.	683
Boger D. L.	727	Lam K. S.	677
Buettner J. A.	699	Leftwich M. E.	677
Caporale L. H.	727	Liskamp R. M. J.	667
Carbonell R. G.	699	Lou Q.	677
Cheng S.	727	Masecar B. L.	699
Cohen M. P.	659	Milot G.	659
Comer D. D.	727	Moree W. J.	667
Dadd C. A.	699	Myers P. L.	727
de Bont D. B. A.	667	Nielsen J.	693
Dilley G. J.	659	Ostresh J. M.	709
Ding Y.	683	Pavia M. R.	659
Dörner B.	709	Powers T. S.	659
Dubuc G. R.	659	Qabar M.	673
Durgin T. L.	659	Rebek, Jr J.	655
Ecker D. J.	717	Selway C. N.	645
Forman F. W.	659	Shipps, Jr G. W.	655
Freier S. M.	717	Sia C.	673
Hammond D. J.	699	Singh J.	639
Hangauer D. G.	659	Solowej J.	639
Hediger M. E.	659	Spitz U. P.	655
Hentsch M.	699	Sucholeiki I.	659
Hindsgaul O.	683	Tarby C. M.	727
Houghten R. A.	709	Terrett N. K.	645
Huang P. Y.	699	Tong G.	693
Husar G. M.	709	Urban J.	673
Kahn M.	673	Williams J. P.	727
Kanie O.	683	Wyatt J. R.	717
Killar L.	639	Zheng Q.	631
Klein M.	673	Zhou S.	659

Cover Photograph, Bioorganic & Medicinal Chemistry

- 1996: Stereo view of the D₂O solution structure of d(CGCA₃T₃GCG)₂ complexed by the Zn(II) tren-microgonotropen-**6b**. Complex formation involves sequence specific occupancy of minor and major grooves and a distortion angle comparable to that observed for *cis* platin dsDNA complexes (~36°). See Blaskó, A.; Browne, K. A.; Bruice, T. C. *Bioorg. Med. Chem.* **1995**, 3, 631–646.