

Halbsandwichkomplexe des Trimesitylborans Mes₃B: Darstellung und Struktur von Mes₂B[(η^6 -Mes)Cr(CO)₃], MesB[(η^6 -Mes)Cr(CO)₃]₂ und B[(η^6 -Mes)Cr(CO)₃]₃. Redoxverhalten und Fragen der intramolekularen Wechselwirkung

Christoph Elschenbroich*, Peter Kühlkamp, Andreas Behrendt und Klaus Harms

Chem. Ber. 1996, 129, 859–869

On Page 866 Tab. 4 is mentioned in the text but was inadvertently not printed; it is depicted here:

Tab. 4. UV-Vis-Daten der Komplexe [(CO)₃CrMes]BMes₂ (**17**), [(CO)₃CrMes]₂BMes (**18**), B[MesCr(CO)₃]₃ (**19**) und TMB (**15**). – ^a DME. – ^b Acetonitril. – ^c *n*-Hexan. – $\lambda_{\max}$ = Absorptionswellenlänge, ν = Wellenzahl, IL = Intraligandenanregung, CT = Charge-Transfer, MLCT = Metall-Ligand-Charge-Transfer

	$\lambda_{\max}$	ν	
17^a	245 sh	40816	11000 IL
	331	30211	13850 ILCT
	457 (454 ^b)	21882	3200 MLCT
	467 ^c		
18^a	240	41666	31750 IL
	318	31446	20800 ILCT
	490 (486 ^b)	20408	8100 MLCT
	498 ^c		
19^a	240 sh	41666	14800 IL
	318	31446	13000 ILCT
	515 (511 ^b)	19417	3600 MLCT
	519 ^c		
15^a	247	40486	8000 IL
	283	35336	3900 IL
	331	30211	16000 ILCT

The Editors
[C 95217]