

naar gelang van de omstandigheden, wijzigen. Het zijn allen formules van een bemesting gedurende het eerste jaar, terwijl later geringere hoeveelheden voldoende zullen zijn.

a. 1000 à 1500 kil. ijzerslakken.

300 à 500 kil. chloorkalium.

200 à 300 kil. sodanitraat (chilisalpeter).

b. dezelfde formule als a, met vervanging der ijzerslakken door een gelijke hoeveelheid fosphaat van Rocour.

c. 400 à 600 kil. superphosphaten.

300 à 400 kil. chloorkalium.

200 à 250 kil. sodiumnitraat of 200 kil. zwavelzure ammoniak.

G. STAES.

KORTE MEDEDEELINGEN.

De Bestrijding van de Kruis- of Stekelbesbladwesp (*Nematus ventricosus*). — LAUREYS zegt omtrent dit insect, waarvan de larven de bessenstruiken soms gansch kaalvreten. (Zie voor de levensbeschrijving : *Tijdschrift over Plantenziekten*, 1^e jaarg., bl. 62) het volgende : “ Zijn uwe bessenboompjes aangetast, dan bespuitte men best, en wel langs onderen en boven, de bladeren met kopersulfaat. Niets heeft ons ieder jaar betere, afdoende uitslagen gegeven. ” (*Landbode*, 19 Mei 1900).

Wij hebben reden om te onderstellen, dat hier niet een oplossing van kopersulfaat alleen, maar de gewone Bordeauxsche pap wordt bedoeld, daar vele planten een zuivere oplossing van zwavelzuurkoper niet verdragen, uitgenomen in zeer verdunden toestand.
