

der „ Nederlandsche Handelmaatschappij „, waarin o. a. het volgende voorkwam :

„ Omtrent de door U aangegeven bestrijdings-methode deelen onze agenten ons nog mede, dat deze, volgens bericht in de aldaar verschijnende couranten, door verschillende planters met succès wordt toegepast, voorzoover de ziekte der krul-loten nog wordt aangetroffen, hetgeen op weinige plantages in verontrustende mate het geval is, uitgezonderd misschien in het Saramacca-district, waar drainingsomstandigheden van ongunstigen invloed zijn „.

Amsterdam,

J. RITZEMA BOS.

29 Mei 1900.

Verklaring der platen.

- Plaat 4. — Een heksenbezem van den cacaoboorn, naar eene photographie van A. W. Drost, *a.b.* = de tak waarop de heksenbezem zit; *c.* = jonge vrucht.
- Plaat 5. — Een heksenbezem van den cacaoboorn, naar eene photographie van A. W. Drost.
- Plaat 6. — Een heksenbezem van den berkenboom, naar eene photographie van A. W. Drost.
- Plaat 7. — Een eenjarige heksenbezem aan els, veroorzaakt door *Exoascus epiphyllus*; naar Tubeuf.
- Plaat 8. — Een heksenbezem van den kersenboom, veroorzaakt door *Exoascus Cerasi*; naar Tubeuf.
- Plaat 9. — Berkentwijggjes, met normale knoppen *q* en met door de werking van *Phytophus* abnormaal opgezwollen knoppen *p.* (naar eene photographie van A. W. Drost.)
- Plaat 10. — Berkentakje met „ kleine heksenbezempjes „ veroorzaakt door *Phytophus* (A.). Naar een photographie van A. W. Drost.
-

NASCHRIFT BIJ HET OPSTEL

over

„ SCHADELIJKHEID DER MEIDORENHEGGEN OM TUINEN EN AKKERS „

(in de vorige aflevering van dezen jaargang.)

Naar aanleiding van boven aangehaald opstel, maakt Prof. Oudemans te Arnhem, de beroemde kenner van onze inlandsche

zwammen, mij een paar opmerkingen, waarvoor ik hem mijnen dank betuig, en die ik niet aan onze lezers wil onthouden.

Op bl. 43 staat *Mortheira Mespili*; dit moet zijn *Morthisera Mespili*. Daar de naam *Entomosporium Lév.* reeds van 1845 dagteekent, en Fuckel — niet wetende dat dit geslacht bestond — in 1869 den naam *Morthisera* aan zwamsororten gaf met dezelfde generieke eigenschappen als die, welke tot dus ver onder het geslacht *Entomosporium* werden gebracht, zoo moet verder volgens de algemeen aangenomen regelen der nomenclatuur de oudste geslachtsnaam worden gebruikt en niet de nieuwere. De zwam, die ik op bl. 43 *Morthisera Mespili* noemde, moet dus *Entomosporium Mespili* heeten.

Deze zwam tast niet slechts de *takken* en *twijgen* van mispel, pereboom enz. aan, maar allereerst de *bladeren*.

Ten slotte maakt Prof. Oudemans mij opmerkzaam op het voorkomen van eene roestzwam op de bladeren van den mispel en den meidoren, nl. *Aecidium Mespili D. C.*, die op den meidoren voorkomende, meestal *Aecidium Crataegi* of *Roestelia lacerata* wordt genoemd, en aanleiding geeft tot het doen ontstaan van *Gymnosporangium clavariaeforme* op de twijgen van *Juniperus communis*. Zoo kunnen tuinen en kweekerijen, waarin verschillende vormen van deze conifeersoort worden gekweekt, ziek worden door de nabijheid van meidoren.

Ik haast mij, deze opmerkingen van Prof. Oudemans ter kennis van de lezers van mijn boven aangehaald opstel te brengen.

Amsterdam, 10 Juli 1900.

J. RITZEMA BOS.
