

LITERATUUR-LIJST.

- APPEL, O. u. WOLLENWEBER, H. W., 1913. Grundlagen einer Monographie der Gattung *Fusarium* Link. Arb. Kais. Biol. Anst. f. Land- u. Forstwirtschaft. Band VIII, p. 1.
- ATANASOFF, D., 1920. *Fusarium*-blight of wheat and other cereals. Jour. agr. res., Vol. XX, p. 88.
- BACCARINI, P., 1890. Sullo suiluppo dei pycnidii. Nuovo Gior. Bot. Ital., Vol. 22, p. 150.
- BARY, A. DE, 1884. Vergleichende Morphologie und Biologie der Pilze, Myzetozoën und Bacteriën. Leipzig.
- BAUKE, H., 1876. Beiträge zur Kenntniss der Pycniden, I. Nova Acta K. sl. Leop.-Carol. Deutsch. Akad. Naturforscher. Band XXXVIII. Nr. 5.
- BAUR, E., 1919. Einführung in die experimentelle Vererbungslehre. 4. Aufl. Berlin.
- BENNETT, C. W., 1921. A Phoma rootrot of celery. Michigan, Agr. Exp. Sta., Tech. Bul. 53.
- BENSAUDE, M., 1918. Recherches sur le cycle évolutif et la sexualité chez les Basidiomycetes. Nemours.
- BETTS, E., 1926. Heterothallism of *Ascobolus carbonarius*. Am. Jour. Bot., Vol. XIII, p. 427.
- BLAAUW, A. H., 1919. Beginsel en stof tot onderzoek. Med. Landbouwhoogeschool, Wageningen, Deel XV, p. 205.
- BLAKESLEE, Q. F., 1920. Sexuality in *Mucors*. Science. N. S. Vol. LI, p. 375, 403.
- BREFELD, O., 1891. Untersuchungen aus dem Gesamtgebiete der Mykologie, Heft X, p. 216.
- BRUNSWICK, H., 1924. Neuere Untersuchungen über die Sexualitätsverhältnisse bei den Pilzen. Zeitschr. ind. Abst. u. Vererb. Band XXXIV, p. 214.
- BURGEFF, H., 1914—1925. Untersuchungen über die Variabilität, Sexualität und Erbllichkeit von *Phycomyces*. Flora, N. F. 7, p. 259; 8, p. I.
- BURGER, O. F., 1919. Sexuality in *Cunninghamella*. Bot. Gaz., Vol. 68, p. 134.
- BURKHOLDER, H., 1925. Variations in a member of the genus *Fusarium*, grown in culture for a period of five years. Am. Jour. Bot., Vol. XII, p. 245.
- COONS, C. H., 1916. Factors involved in the growth and pycnidiumformation of *Plenodomus fuscomaculans*. Jour. agr. res., Vol. 5, p. 752.
- , 1917. A Phoma disease of celery. An. Rpt., Michigan Sta. Board Agr., 30, p. 318.
- CRAIGIE, J. G., 1927. Discovery of the function of the pycnidia of the rust fungi. Nature, 120, p. 765.

- DODGE, D. O., 1920. Life history of *Ascobolus magnificus*. *Mycologia*, Vol. 12, p. 115.
- DODGE, B. O., 1923. Origin of the central and ostiolar cavities in pycnidia of certain fungous parasites. *Jour. Agr. Res.*, Vol. 23, p. 743.
- DOROGIN, G., 1923. Instruksia dlja proizvodstva ispytania semjan na prisoetstwiu gribnyck wrediteley. *Petrogradskaja Stantsya Zast-schity Rastenij of wretilay*.
- EDGERTON, C. W., 1914. Plus and minus strains in the genus *Glomerella*. *Am. Jour. Bot.*, Vol. I, p. 244.
- EDSON, M. A., 1915. Histological relations of sugar-beet seedlings and *Phoma betae*. *Jour. Agr. Res.*, Vol. V, p. 55.
- GÄUMANN, E., 1926. *Vergleichende Morphologie der Pilze*. Jena.
- HALSTED, B. D., 1891. The celery-leafspot. *Ann. Rpt. New Jersey. Agr. Exp. Sta.*, 12, p. 253.
- HANNA, W. F., 1925. The problem of sex in *Coprinus lagopus*. *An. Bot.* Vol. 39, p. 431.
- HEDGCOCK, G. G., 1904. Proof of the identity of *Phoma* and *Phyllosticta* on the sugarbeet. *Jour. Myc.*, Vol. 10.
- HESLER, L. R., 1915. Blackrot leafspot and canker of Pomatious fruit. *Cornell Agr. Exp. Sta.*, Bul. 379, p. 51.
- HOLLRUNG, 1903. Trockene Bakteriosen. *Jahresbericht des Sonderaus-schusses f. Pflanzenschutz.*, p. 130. *Arb. D. L. G.*, Heft 94.
- JAUCHEN, 1909. Der Gemüsebau in der Umgegend von Zerbst. *Jahrb. d. D. L. G.*, Band 24, p. 454.
- KELLERMANN, A. A. M., 1903. Trockene Bakteriosen. *Jahresbericht d. Sonderausschusses f. Pflanzenschutz*, p. 129. *Arb. D. L. G.*, Heft 94.
- KEMPTON, F. E., 1919. Origin and development of the pycnidium. *Bot. Gaz.*, Vol. LXVIII, p. 233.
- KILLIAN, M. CH., 1926. Variations des caractères morphologiques et biologiques chez les Ascomycètes et les Deuteromycètes parasites. *Rev. Path. Vég.* Tome 13, p. 134.
- KLEBAHN, H., 1910. Krankheiten des Selleries. *Zeitschr. f. Pfl. Krankh.*, Bd. XX, p. 1.
- , 1918. Haupt- und Nebenfruchtformen der Ascomyceten, I. Teil, p. 33 en 34. Leipzig.
- , 1921. Der Pilz der Tomatenstengelkrankheit und seine Schlauchfruchtform. *Zeitschr. f. Pfl. Krankh.*, Bd. XXXI, p. 1.
- KNIEP, H., 1919. Über morphologische und physiologische Geschlechts-differenzierung. *Verh. Phys. Mediz. Gesellsch. Würzburg. N. F.*, Band 46, p. 1.
- LARUE, C. D., 1925. Loss of virulence in fungi. *Science. N. S.*, Vol. LXII. p. 205.
- MASSEY, L. M., 1928. Dry rot of *Gladiolus* corms. *Phytopathology*, Vol. 18, p. 525.
- MCCORMICK, F. A., 1926. Perithecia of *Thielavia basicola* Zopf in culture and the stimulation of their production by extracts from other fungi. *Rev. Appl. Myc.*, Vol. V, p. 392.
- MERCER, W. B., 1913. On the morphology and development of *Phoma Richardiae* n. sp. *Myc. Centralbl.*, Bd. II, p. 244.
- MOUNCE, I., 1921. Homothallism and the production of fruitbodies by monosporous mycelia in the genus *Coprinus*. *Trans. Brit. Myc. Soc.*, Vol. 7, p. 198.
- MULLER, H. R. A., 1925. Een onderzoek naar den invloed van eenige ont-smettingsmiddelen op de kiemkracht van tomaten- en selderijzaad.

- Landbouwhoogeschool, Wageningen, Lab. v. Tuinbouwplantenteelt, No. 2.
- PETHYBRIDGE, G. H., 1916. The Verticillium disease of the potato. *Scient. Proc. Roy. Dublin Soc.*, Vol. XV, p. 79.
- , 1926. Root rot. *Ministr. Agr. and Fisheries. Misc. Publ.*, No. 52, p. 47.
- PRATT, CL. A., 1924. The staling of fungal cultures, I. *An. Bot.* Vol. XXXVIII, p. 570.
- QUANJER, H. M. en SLAGTER, N., 1914. De roest of schurftziekte van de selderijknol en enkele opmerkingen over andere selderieziekten. *Tijdschr. o. Plantenziekten*, Jaarg. 20, p. 13.
- RITZEMA BOS, J., 1904. Bakteriënziekten van Knolselderij. *Tijdschr. o. Plantenziekten*, Jaarg. 10, p. 15.
- REDDICK, D., 1911. The blackrot disease of grapes. *Cornell. Agr. Exp. Sta.*, Bul. 293, p. 289.
- SHEAR, C. D. and WOOD, A. K., 1913. Studies of fungous parasites belonging to the genus *Glomerella*. *U. S. Dept. Agr. Bur. Plant Indus.* Bul. 252, p. 74.
- SCHEGG, H., 1915. Zur Entwicklungsgeschichte und Biologie der Pycniden, der Schlingenmycelien und Hyphenknäuel. *Centralbl. f. Bakt.*, II, Bd. 43, p. 326, 339.
- STAKMAN, E. C. and CHRISTENSEN, J. J., 1927. Heterothallism in *Ustilago zaeae*. *Phytopathology*, Vol. 17, p. 827.
- STEGELICH, 1898—1900. Sellerierost. Bakteriose. Bakteriosen. Jahresbericht d. Sonderausschusses f. Pflanzenschutz. *Arb. d. D. L. G.*, Heft 38, p. 103. H. 50, p. 136. H. 60, p. 161.
- STRASBURGER, E., 1909. Meine Stellungnahme zur Frage der Pfropfbastarde. *Ber. d. dtsh. bot. Ges.*, Bd. 27, p. 520.
- TAVEL, F. VON, 1886. Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Pyrenomyceten. *Bot. Zeit.*, Bd. 44, p. 825.
- TEMPEL, W., 1926. Die Schorfkrankheit der Sellerieknollen. *Die kranke Pflanze*, Bd. III, p. 188.
- VANDENDRIES, R., 1923. Recherches sur le déterminisme sexuel des Basidiomycètes. *Bruxelles*.
- VAN HOOK, J. M., 1907. Celery rootrot. *Ohio Agr. Exp. Sta.*, Circ. 72.
- WESTERDIJK, J. und VAN LUYK, A., 1920. Die Künstliche Kultur von Phoma-Arten., *Meded. uit het Phytopath. Lab. W. C. Scholten*, IV, p. 26.
- WILSON, E. E., 1927. Effect of fungous extracts upon the initiation and growth of the perithecia of *Venturia inaequalis* (Cke) Wint., in pure culture. *Phytopathology*, Vol. 17, p. 835.
- ZOFF, W., 1890. *Die Pilze*. Breslau, p. 54.