

IS DE AANTASTING VAN PESTELOZZIA GUEPINI OP RHODODENDRON PRIMAIR OF SECUNDAIR? ¹⁾

DOOR

J. ZWARTENDIJK

Plantenziektenkundige Dienst, Boskoop

Reeds meermalen werd door mij waargenomen, dat, wanneer Rhododendrons waren aangetast door *Pestellozzia guepini*, de ziekte steeds het eerst voorkwam op de bladeren en dat die aangetaste bladeren steeds eerst beschadigd waren geweest, b.v. door wind of ten gevolge van een minder juiste bemesting of iets dergelijks en na de bladaantasting vond pas in enkele gevallen de twijgbeschadiging plaats.

Opmerkelijk was steeds, dat onbeschadigde bladeren aan dezelfde plant gezond bleven.

Weer een typisch voorbeeld nam ik een dezer dagen waar: In den proeftuin werden entingsproeven genomen met Rhododendrons. Een gedeelte der griffels (enten) bleef onbehandeld als contrôlemateriaal, een ander gedeelte onderging een warmwaterbehandeling, terwijl het resterende gedeelte werd behandeld met aethyleenchloorhydrine. De proef werd met verschillende hybriden uitgevoerd. Reeds spoedig na de behandeling kon men zien, dat de griffels geleden hadden door de aethyleenchloorhydrine en na betrekkelijk korten tijd waren deze griffels aangetast door *Pestellozzia*, terwijl de griffels behandeld met warm water, evenals de contrôle-griffels kerngezond bleven, en toch ook tot dezelfde hybride behoorden, vermoedelijk zelfs van dezelfde plant afkomstig waren. Mijn mening werd hierdoor nog meer gesterkt, dat *Pestellozzia*, althans in de cultuur, niet primair doch slechts secundair optreedt, zoodat we zooveel mogelijk dienen te zorgen, dat bladbeschadiging wordt voorkomen.


EEN BLADVLEKKENZIEKTE BIJ BONEN VEROORZAAKT DOOR ISARIOPSIS GRISEOLA SACC. ¹⁾

With a summary: Leaf spots in beans caused by Isariopsis griseola Sacc.

DOOR

J. GREMMEN JR

Laboratorium voor Mycologie en Aardappelonderzoek



Bij een bezoek aan het Instituut voor Plantenveredeling met den heer Ir W. WILTEN in September 1946, voor observatie van de aantasting van de peulen door *Colletotrichum Lindemuthianum*, bleek mij, dat bij enkele nog te velde staande rassen landbouwstambonen typische bladvlekken optraden. Dit was o.a. het geval met de Beka bruine boon, welke nog vrij veel blad had en waarop talrijke van deze vlekken zichtbaar waren. Genoemde vlekken waren opvallend vierkant van vorm, donkerbruin van kleur en niet begrensd door de nerven, roals dit bij *Colletotrichum* het geval is. Daar de peulen al geheel rijp waren en de meeste totaal groen door *Cladosporium*

¹⁾ Ontvangen voor publicatie Jan. 1947.