

ONDERZOEKINGEN BETREFFENDE BESSEVIRUSSEN IN NEDERLAND

I. LEPELBLAD VAN RODE BES¹

With a summary: Investigations of currant viruses in The Netherlands

I. Spoon leaf of red currant

DOOR

F. A. VAN DER MEER

Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek, Wageningen

INLEIDING

Een van de belangrijkste rode-bessecentra in Nederland is het fruitteeltgebied in Noordholland, dat met de naam „de Bangert” wordt aangeduid. Strikt genomen is Bangert een buurtschap, die gedeeltelijk tot de gemeente Zwaag en gedeeltelijk tot de gemeente Blokker behoort. Als men in de fruitteelt over „de Bangert” spreekt bedoelt men echter veelal een groter gebied. IGNATIUS (1943) schrijft over „de Bangert”: „Dit laatste centrum omvat een gedeelte van West-Friesland met o.a. de plaatsen Wognum, Blokker, Zwaag, Schellinkhout en Wijdenes”. SPRENGER (1948) vermeldt voor „de Bangert” 1026 ha fruitteelt en bedoelt dus ook „de Bangert” in ruimere zin. Waar derhalve in dit artikel sprake is van „de Bangert” wordt niet de buurtschap bedoeld doch het fruitteeltcentrum. Volgens de Tuinbouwgid (1959) bedroeg in 1957 de aanvoer van rode en witte bessen op de veilingen Zwaag en Blokker tezamen 500.000 kg, hetgeen ruim 10% is van de totale Nederlandse produktie. Voor een groot gedeelte wordt de teelt van rode bessen in „de Bangert” nog bedreven als onderteelt in oude half-stamboomgaarden met een zeer gevarieerde en onregelmatige beplanting van verschillende soorten appels, peren en pruimen. Het instandhouden van die tuinen geschiedt door jaarlijkse incidentele vervanging van de slechte vruchtbomen en bessestruiken. Deze typisch Bangertse teeltwijze is reeds eeuwen oud en bedrijven waar al 100 jaar achtereen bessen op dezelfde grond worden geteeld zijn in „de Bangert” geen zeldzaamheid. Hoewel binnen korte afstanden soms vrij sterke verschillen optreden kan de grondsoort in „de Bangert” in het algemeen worden aangeduid als zware zavel tot lichte klei.

Een van de meest voorkomende besseziekten in deze oude tuinen is lepelblad, een virusziekte welke – volgens mededelingen van oudere tuinders – reeds omstreeks 1920 bekend was. Voor zover schrijver heeft kunnen nagaan werd de naam lepelblad of „lepelvormigheid” voor het eerst gebruikt door MAARSE (1926) en later ook door VAN POETEREN (1926), RIETSEMA (1943) en HUS (1944). MAARSE geeft een duidelijke, zij het beknopte, beschrijving van de ziekte. VAN KATWIJK (1953) vermeldt, dat lepelblad kan worden overgebracht door enten. De ziekte is voornamelijk beperkt tot „de Bangert” en komt in andere delen van ons land niet of nauwelijks voor. Uit het buitenland zijn geen gegevens bekend over het voorkomen van lepelblad.

¹ Aangenomen voor publikatie 20 januari 1960.

MATERIAAL EN METHODIEK

De entproeven werden uitgevoerd volgens de zg. „bottle grafting” methode, die door CADMAN (1951) gebruikt werd ten behoeve van zijn onderzoek over frambozevirussen. Bij deze manier van enten wordt zowel van de ent als van de onderstam een stukje bast losgesneden. De beide zo verkregen lipjes worden op elkaar geschoven, waarna het geheel met kleefpleister wordt omwonden. Het onder eind van de ent wordt vervolgens in een buisje met water geplaatst om uitdroging te voorkomen.

Als toetsplanten werden jonge besseplanten gebruikt, die gegroeid waren uit stek van door de N.A.K.-B goedgekeurde moederstruiken. De planten werden opgekweekt in een luisdicht warenhuis. In december, ongeveer vier maanden na het enten, werden de planten buiten opgeplant tezamen met een aantal niet-geënte controleplanten.

Sapinfecties werden uitgevoerd met sap uit zeer jong besseblad, waaraan vóór het uitpersen een ongeveer gelijke gewichtshoeveelheid water was toegevoegd. Het op die wijze verkregen perssap werd uitgewreven op tabaksplanten, die tevoren met carborundum waren bestoven. Wanneer geen jong besseblad beschikbaar was, bv. in het najaar of in de winter, dan werden knoppen van éénjarige scheuten gebruikt. Deze knoppen werden ontdaan van de schubben en alleen het binnenste zachte gedeelte van de knop, met de bloem en bladprimordien werd gebruikt voor sapproductie. Aan dit materiaal werd vóór het uitpersen een drie- tot viermaal grotere gewichtshoeveelheid water toegevoegd. De infectie gelukte niet als de knopschubben niet werden verwijderd.

SYMPTOMEN OP RODE BES

Deze bestaan uit misvorming van de bladeren, waarbij in extreme gevallen de insnijdingen tussen de bladlobben vrijwel geheel verdwijnen en het aantal tanden in de bladrand sterk vermindert. Soms ontbreekt de tanding in de bladrand geheel. De vorm van de bladeren verandert daardoor van vijflobbig in bijna rond. De bladrand is vaak naar beneden omgebogen, zodat het blad enigszins de vorm van een lepel krijgt. Ook komt het voor, dat de bladeren in de middennerf bijna dubbelvouwen zodat zij dakvormig worden (fig. 1a). Het oppervlak van deze ernstig misvormde bladeren is meestal sterk gereduceerd. Naast struiken met genoemde ernstige symptomen vindt men ook struiken met veel zwakkere ziekteverschijnselen, waarbij het aantal tanden in de bladrand maar weinig kleiner is en de insnijdingen tussen de bladlobben slechts iets minder diep zijn dan bij gezonde planten (fig. 1b). Planten met dergelijke zwakke symptomen zijn soms moeilijk van gezonde planten te onderscheiden (fig. 1c). Tussen deze twee uiterste vormen van lepelblad komen talrijke overgangen voor, doch men treft deze in het algemeen niet bij één plant aan. Veeleer vindt men aan verschillende struiken verschillende vormen van lepelblad. Hieruit zou men kunnen afleiden, dat er verschillende stammen van lepelblad voorkomen, wat ook verder in dit artikel nog ter sprake komt. De groeikracht van lepelbladzieke struiken gaat soms vrij sterk achteruit, vooral wanneer het struiken betreft met ernstige symptomen, doch een nauwkeurige vergelijking van aangetaste struiken met gezonde buurstruiken is in de Bangertse tuinen onmogelijk, omdat de leeftijd van de bessestruiken in een tuin sterk uiteenloopt. Slechts in één geval te Wemeldinge (Zld), waar enkele lepelbladzieke struiken met zwakke symptomen

werden gevonden in een uniforme aanplant van ongeveer vijf jaar oud, was vergelijkbaar mogelijk. Aan deze struiken, die waarschijnlijk ziek geplant waren, kon geen groeivermindering en ook geen opbrengstreductie worden vastgesteld. Volgens sommige tuinders in „de Bangert” zouden de stelen der vruchttrossen van zieke planten dikker worden en de bessen kleiner blijven. Waarnemingen hieromtrent hebben deze mening nog niet overtuigend kunnen bevestigen.

OVERBRENGINGSPROEVEN

1. Entproeven

In juli 1957 werd een aantal rode en zwarte bessen geënt met materiaal van lepelbladzieke struiken van verschillende herkomst. Bij twee der geënte rodebessastruiken behorend tot de rassen Fay's Prolific en Laxton's Perfection werd in april 1958 een bontheid op de bladeren van het overjarige hout waargenomen. Deze bontheid kwam verspreid over de tweejarige struiken voor, echter met uitzondering van de takken waarop in 1957 de zieke enten werden geplaatst. Aan de jonge scheuten, die in de loop van het groeiseizoen op deze geënte takken ontstonden, werden eind mei de eerste symptomen van lepelblad waargenomen. Aan het eind van de groeiperiode vertoonden ook de op de andere takken ontstane jonge scheuten lepelbladsymptomen. Beide planten waren geënt met takken van dezelfde zieke struik, die afkomstig was uit een tuin te Blokker. De vier overige struiken, behorend tot dezelfde rassen, welke geënt waren met materiaal van andere zieke struiken, werden niet duidelijk bont, maar vertoonden wel aan het eind van het jaar typische lepelbladsymptomen. In de zomer van 1959 werd aan geen dezer geënte rode bessen meer bontheid waargenomen. Van de vier geënte zwarte bessastruiken, behorend tot vier verschillende rassen, vertoonde die van het ras Baldwin (type Hilltop) in april 1958 aan een dicht bij de entplaats gegroeide jonge scheut in enkele bladeren een bontheid. Deze bestond in een uit witte vlekjes opgebouwd lijnenpatroon, op enige afstand van de bladrand (fig. 2). Het overige gedeelte van de struik vertoonde geen afwijking. In mei 1959 werd deze bontheid weer waargenomen en wel in drie scheuten, die gegroeid waren op de in 1957 geënte tak. De andere takken van de struik hadden ook nu nog geen symptomen. Een geënte plant van het ras Cotswold Cross vertoonde in mei 1959 deze bontheid eveneens. Ook bij deze plant bleef het verschijnsel beperkt tot de onderste bladeren van enkele in de buurt van de entplaats ontstane jonge scheuten. Alle zwarte bessen waren geënt met materiaal van dezelfde lepelbladzieke struik, afkomstig uit Wemeldinge.

2. Sapinoculaties

a. Overdracht van bessen op kruidachtige planten

Eind mei 1958 werden op *Nicotiana rustica*, *N. tabacum* var. White Burley en *Chenopodium amaranticolor* sapinoculaties verricht met sap van één der bonte rode bessen uit de bovengenoemde entproeven. Na ongeveer 12 dagen verschenen op de geïnoculeerde bladeren van *N. rustica* loodgrijze kringetjes ter grootte van 2 mm, die later necrotisch werden en in elkaar overgingen. Ongeveer drie weken na de inoculatie werden spreidsymptomen waargenomen in de vorm van gele en licht groene kringetjes met een middellijn van 1 cm. Een aantal van deze kringen werd later necrotisch. *N. tabacum* vertoonde 12 dagen na de inoculatie op de geïnoculeerde bladeren enkele necrotische kringen met een doorsnede van




FIG. 1. Bladeren van eenjarige scheuten van het ras Fay's Prolific,

- A Ernstige lepelbladsymptomen
- B Zwakke lepelbladsymptomen
- C Bladeren van een gezonde struik

Leaves of vegetative shoots of the red currant variety Fay's Prolific,

- A *Severe symptoms of spoon leaf*
- B *Mild symptoms of spoon leaf*
- C *Leaves of a healthy bush*



FIG. 2.

Blad van een zwarte bes, var. Baldwin, in 1957 geënt met rode bes die lepelblad vertoonde. Foto genomen voorjaar 1958.

Leaf of black currant, grafted in 1957 with red currant showing spoon leaf. Photograph taken spring 1958.



FIG. 3. *N. tabacum* var. White Burley. Spreidsymptomen van twee virusisolaties, die werden verkregen uit twee verschillende rode-bessestruiken. Foto genomen na verschillende passages op tabak. De planten zijn even oud en op dezelfde dag geïnoculeerd.

Systemic symptoms on N. tabacum var. White Burley of two different virus isolates from spoon leaf diseased red currants after some passages on tobacco. The plants are of the same age and were inoculated on the same day.



FIG. 4. *N. tabacum* var. White Burley. Lokale symptomen van twee virusisolaties, die werden verkregen uit twee verschillende rode-besstruiken. Foto genomen na verschillende passages op tabak. Het linker blad vertoont alleen concentrische kringen, het rechter blad bovendien necrose.

Leaves of N. tabacum var. White Burley inoculated with different virus isolates from spoon leaf diseased red currants. The leaf at the left shows concentric rings only, the right one also necrosis.



FIG. 5. Symptomen op tomaat na inoculatie met een uit lepelbladzieke rode bes verkregen virus. Links, lokale symptomen in de vorm van gele vlekken. Rechts, spreidsymptomen: necrose en bladmisvorming.

Symptoms on tomato after inoculation with a virus from spoon leaf diseased red currant. Left an inoculated leaf showing yellow spots. Right leaf showing systemic symptoms i.e. necrosis and deformation.



FIG. 6. Spreidsymptomen op *Callistephus chinensis* na inoculatie met een virus uit lepelbladzieke rode bes.

Systemic symptoms on Callistephus chinensis, inoculated with a virus from spoon leaf diseased red currant.



FIG. 7. Links gezonde plant. Rechts plant geïnoculeerd met sap van tabak geïnfecteerd met een virus afkomstig van lepelbladzieke rode bes. De middelste bladeren zijn bont, de laatstgevormde bladeren zijn duidelijk lepelvormig.

Left a healthy red currant seedling. Right a seedling inoculated with sap from tobacco infected with a virus from spoon leaf diseased red currant. The top leaves show symptoms of spoon leaf. Some of the older leaves show mosaic symptoms.



FIG. 8. Tak van een op natuurlijke wijze geïnfecteerde rode bes. De eerst gevormde bladeren zijn normaal, daarna volgen enkele bonte bladeren en de bovenste bladeren zijn duidelijk lepelvormig. De op deze foto afgebeelde vorm van bontheid komt het meest algemeen als eerste symptoom van lepelblad voor.

Shoot of a naturally infected plant. The first grown leaves are normal, the leaves at the middle show mosaic and the top leaves are spoon shaped. This type of mosaic is most common as the first symptom of spoon leaf.




FIG. 9. Bladeren van eenjarige scheuten van het ras Fay's Prolific.

A Grote helder gele kringen.

B Onregelmatige gele lijnen.

C Met de nervatuur samenhangende lijnpatronen.

Deze drie afwijkende vormen van bontheid werden slechts bij enkele struiken waargenomen doch houden waarschijnlijk ook verband met lepelblad en wel als eerste symptoom er van.

D Gele banden langs de nerven, werd alleen gevonden bij een aantal struiken die geheel lepelbladziek waren, en geen enkele maal bij lepelbladvrije struiken. De bladeren die deze bontheid vertoonden waren dan ook meestal zelf reeds min of meer duidelijk lepelvormig, dit in tegenstelling tot bladeren die andere vormen van bontheid vertonen.

Leaves of vegetative shoots of the red currant variety Fay's Prolific.

A Vivid yellow rings.

B Irregular yellow lines.

C Yellow lines following the veins.

These three forms of mosaic were found only on some bushes but probably they are also connected with spoon leaf, being a first symptom of it.

D Yellow bands along the veins, only found on some spoon leaf-diseased bushes and not on healthy plants. The leaves showing this type of mosaic were therefore mostly spoon shaped. Leaves showing the other types of mosaic were not spoon shaped.

ongeveer 12 mm. Bij deze soort werden geen spreidsymptomen waargenomen. De geïnoculeerde bladeren van *C. amaranticolor* reageerden na drie weken met rode kringetjes ter grootte van ongeveer 3 mm. Deze plant vertoonde evenmin spreidsymptomen. Er werden ook inoculatieproeven gedaan met sap uit de bonte bladeren van de bij de entproeven vermelde zwarte bes. Hiermee werden alleen symptomen verkregen op *N. rustica*, eveneens in de vorm van grijze kringetjes. In dit geval werden de kringen echter niet necrotisch en er ontstonden evenmin spreidsymptomen. Er bestond dus een duidelijk verschil tussen de beide verkregen virusisolaties (fig. 3). Dit verschil bleef ook na herhaald overbrengen van tabak op tabak duidelijk waarneembaar. In de loop van 1958 werden voorts virusisolaties verkregen uit nog negen andere lepelbladzieke struiken, afkomstig van vier verschillende Bangertse bedrijven. Sapinoculatie op tabak met materiaal van 13 lepelbladvrije struiken van dezelfde bedrijven gaf in geen enkel geval een positief resultaat. Evenals de beide eerste isolaties gaven ook de latere isolaties soms vrij sterke onderlinge verschillen te zien. Hoewel ook de symptomen van één isolatie gedurende de verschillende passages op tabak soms vrij sterk varieerden, kwamen toch bij verschillende isolaties steeds dezelfde typische eigenschappen naar voren. De verschillende kruidachtige planten, waarop het virus kon worden overgebracht, gaven symptomen die hieronder zullen worden beschreven.

Nicotiana tabacum var. White Burley

Op de geïnoculeerde bladeren verschenen een week na de inoculatie gele vlekken van ongeveer 4 mm grootte. Bij sommige virusisolaties werden deze vlekken necrotisch, bij andere verdwenen zij op de duur en werden de geïnoculeerde bladeren bij het ouder worden der planten egaal geel. Soms vertoonden deze lokale lesies een duidelijke kringvorm. Bij één isolatie werden als lokale symptomen fraaie concentrische ringen verkregen, die niet necrotisch werden (fig. 4). In enkele proeven ontstonden op de geïnoculeerde bladeren grote enkelvoudige necrotische kringen met een middellijn van 10 tot 12 mm; dezelfde isolaties gaven in andere proeven veel kleinere kringen en vlekken te zien. Mogelijk hield dit verband met de leeftijd der geïnoculeerde planten. Spreidsymptomen werden vooral verkregen met die isolaties die ook heftige lokale symptomen veroorzaakten. Deze bestonden soms uit zigzaglijnen langs de nerven, soms uit necrotische kringvlekken en vaak uit enkele grote concentrische kringpatronen. In verscheidene proeven met zwakke isolaties werden op White Burley in het geheel geen symptomen verkregen. In het algemeen waren de reacties gedurende de wintermaanden heftiger dan in de zomermaanden.

Nicotiana rustica

Ongeveer acht dagen na de inoculatie ontstonden op de geïnoculeerde bladeren loodgrijze kringetjes met een doorsnede van 2 tot 3 mm. Bij enkele isolaties ging dit gepaard met heftige necrose; andere gaven in het geheel geen necrose te zien. Spreidsymptomen verschenen meestal 14 tot 16 dagen na de inoculatie en wel in de vorm van gele en lichtgroene kringen ter grootte van ongeveer 10 mm. Wanneer lokale necrose optrad dan werd deze in de meeste gevallen later systemisch. In deze gevallen was de groei dikwijls sterk geremd. De planten gingen echter nooit geheel te gronde en meestal volgde vier tot zes weken na de inoculaties enig herstel.

Tomaat

Lokale symptomen, bestaande uit vage, gele vlekken, werden 10 tot 14 dagen na de inoculatie zichtbaar. Daarna trad systemische necrose op, veelal gepaard gaande met heftige bladmisvorming (fig. 5). Sommige isolaties brachten spreidsymptomen teweeg in de vorm van concentrische kringetjes. Oudere planten vertoonden dikwijls een grijsachtige tot gele chlorose in de top, die sterk deed denken aan spintaantasting. Deze beschrijving geldt alleen voor de in de wintermaanden uitgevoerde inoculatieproeven, in de zomermaanden werden veel minder duidelijke symptomen verkregen.

Komkommer

Een in juni 1958 uitgevoerde inoculatieproef op komkommer leverde geen enkel ziekteverschijnsel op. In november werd de proef herhaald met negen verschillende isolaties. Bij alle isolaties werden toen op de geïnoculeerde bladeren kleine gele vlekjes verkregen. Vier van de negen isolaties gaven bovendien spreidsymptomen in de vorm van een vaag mozaïek.

Chenopodium amaranticolor

Op de bladeren verschenen ongeveer 14 dagen na het inoculeren bruinrode vlekjes met een doorsnede van 2 tot 3 mm. Er werden geen spreidsymptomen waargenomen. Pogingen om het virus van *Chenopodium* over te brengen op andere planten gelukten niet.

Callistephus chinensis

Deze plant reageerde op inoculatie niet met lokale symptomen. In een in juli 1958 genomen proef werden op een paar niet geïnoculeerde bladeren van enkele planten zigzaglijnen langs de nerven verkregen, die tezamen een min of meer volledig eikebladpatroon vormden. Bij inoculatie van aster in december 1958 werden spreidsymptomen verkregen: kleine, heldere, gele vlekjes, grotere, vaag gele vlekken en soms vergeling van grote aaneengesloten bladgedeelten (fig. 6).

Beta vulgaris

Van negen verschillende isolaties gaven er slechts twee symptomen op suikerbiet. Deze bestonden uit lichtgroene kringvlekjes ter grootte van ongeveer 4 mm op de geïnoculeerde bladeren en een vaag mozaïek, dat samenging met enige bladmisvorming op de na de inoculatie ontstane bladeren.

Infectieproeven op *Phaseolus vulgaris*, *Vicia faba* en verschillende erwterassen leverden geen symptomen op.

b. Overdracht van kruidachtige planten op bes

Gedurende de maanden maart en april werd getracht de verschillende van bes verkregen virusisolaties van tomaat terug te brengen op bes. Hiervoor werden jonge bessezaailingen gebruikt, die vier of vijf bladeren hadden. In geen enkel geval kon virusoverdracht worden vastgesteld. Op 21 april werd een inoculatieproef uitgevoerd met sap van *Nicotiana rustica* op 16 bessezaailingen van het ras Fay's Prolific. In deze proef werd wel virusoverdracht verkregen. Na 16 dagen was nl. bij één der geïnoculeerde planten op één der jongste bladeren een duidelijk mozaïek waar te nemen. Na 18 dagen vertoonden nog twee zaailingen

dezelfde verschijnselen. Aan deze twee laatste planten ontstonden nog enkele bonte bladeren, waarna verdere bladvorming achterwege bleef. De eerstgenoemde plant groeide wat langer door en vormde achtereenvolgens vijf bonte bladeren, drie normale, groene bladeren zonder vormafwijking en tenslotte een vijftal bladeren met onmiskenbare lepelbladsymptomen (fig. 7). De bontheid op de vijf vermelde bladeren bestond uit lichtgele vlekken afgewisseld met een gele verkleuring van grote bladgedeelten. Deze geelkleuring van grote bladgedeelten veroorzaakte soms een plaatselijke groeiremming in het blad, waardoor de bladhelften ongelijk van grootte werden. Het is opmerkelijk, dat ook in de proeven met sapinoculatie de lepelbladsymptomen voorafgegaan werden door een bontheid, die later weer verdween. Het lag dus voor de hand om ook in praktijkaanplantingen te speuren naar een eventueel met lepelblad verband houdende bontheid.

VELDWAARNEMINGEN¹

1. *Bontheid in verband met lepelblad*

Op 20 mei 1959 werden zes Bangertse bedrijven bezocht. Op elk daarvan werden verscheidene struiken gevonden met een bontheid, die sterk deed denken aan de symptomen welke in de sapinoculatieproef op bessezaailingen werden verkregen. De planten vertoonden alleen bontheid in de bladeren van de jonge kruidachtige scheuten. In geen enkel geval werd echter in praktijkaanplantingen bontheid van het blad aan de overjarige takken waargenomen, zoals die in de beschreven entproeven werd verkregen. Op één bedrijf, waar op 2 juni 1954 120 bonte struiken aanwezig waren werden uitvoerige waarnemingen verricht. Van de 2724 struiken van dat bedrijf werden er 1026 aangemerkt als lepelbladziek. Deze lepelbladstruiken vertoonden geen bontheid. Van de 120 bonte struiken hadden er 48 alleen bontheid; de overige 72 gaven in een gedeelte der takken reeds lepelblad te zien. De bontheid werd hierbij zonder uitzondering alleen gevonden in die takken, die nog geen lepelblad vertoonden. In geheel lepelblad-zieke struiken werd nooit bontheid waargenomen. Op 8 juli had een aantal van de op 2 juni gemerkte bonte planten in de top van de bonte scheuten duidelijk lepelbladsymptomen (fig. 8). Het betrof hier in de meeste gevallen goed groeiende scheuten, die een groot aantal bladeren vormden, waarvan de onderste reeds bont waren. Minder goed groeiende scheuten of scheuten, waarvan de bonte bladeren hoger geplaatst waren, vertoonden geen of onduidelijk lepelblad in de top. Aangezien op 8 juli de lengtegroei der jonge scheuten vrijwel voltooid was konden deze zomer geen verdere waarnemingen gedaan worden. Het beeld van die jonge bonte scheuten komt vrij goed overeen met de in de sapinoculatieproeven verkregen symptoomontwikkeling. Ook in de praktijk blijkt lepelblad dus voorafgegaan te worden door een bontheid van de bladeren. Door middel van waarnemingen in gekarteerde aanplantingen zal worden onderzocht of dit bij iedere nieuwe infectie het geval is. De bontheid was niet altijd zo duidelijk als in fig. 8 te zien is en bleef bij sommige struiken beperkt tot enkele kleine, lichtgele vlekken op slechts enkele bladeren. Soms werden lijnenpatronen gevonden, die met de nervatuur samenvielen (fig. 9c); een andere maal verliepen deze lijnenpatronen veel grilliger (fig. 9b). Bij verscheidene struiken werden

¹ Bij deze veldwaarnemingen werd zeer veel medewerking verkregen van de heer J. JONG, assistent van het Rijkstuinbouwconsulentschap Hoorn, waarvoor onze hartelijke dank.

duidelijke kringen waargenomen op de bladeren, soms met ovalen langs de nerven (fig. 9a). Ook werden gedeeltelijk lepelbladzieke struiken gevonden, die geen bonthheid vertoonden. Een andere, mogelijk ook met lepelblad verband houdende bonthheid wordt gevormd door kleine vlekjes gerangschikt in banden langs de nerven, zg. veinbanding (fig. 9d). Deze bonthheid werd namelijk tot nu toe alleen gevonden bij 18 lepelbladzieke struiken. Bij gezonde planten en ook bij het overgrote deel der onderzochte lepelbladzieke struiken werd deze bonthheid niet waargenomen.

2. *Verspreiding van lepelblad in praktijkaanplantingen*

Uit veldwaarnemingen blijkt, dat verspreiding van lepelblad in de Bangertse tuinen vaak plaats heeft door het gebruik van ziek plantgoed. Vele tuinders winnen namelijk jonge struiken uit stekken van hun eigen bedrijf. Het stekken en het uitplanten van de jonge, meestal tweejarige, struiken geschiedt in de winter als de bessen kaal zijn en er dus geen symptomen zichtbaar zijn. Dit en een soms onvoldoende kennis van de dikwijls onduidelijke symptomen belemmeren het uitroeien van de ziekte door selectie.

Beschouwen we echter de eerder beschreven bonthheid als een eerste symptoom van lepelblad, dan blijkt er naast verspreiding door ziek plantgoed ook verspreiding door nieuwe infecties plaats te vinden. Op welke wijze deze infecties tot stand komen is nog niet duidelijk. In de bovengenoemde bessenaanplant van 2724 struiken, die geheel in kaart werd gebracht, is een sterke haardvorming te constateren. Dit zou kunnen duiden op een mogelijke ongevleugelde, zich langzaam verplaatsende, overbrenger, of op een via de grond plaatshebbende infectie, al of niet door een in die grond levend organisme. Ook is het denkbaar dat het virus door wortelcontact overgaat. Proeven met bessezaailingen in grond, verzameld rondom zieke struiken, hebben tot nog toe geen positief resultaat opgeleverd.

3. *Gevoeligheid van verschillende rassen*

Hierover zijn nog weinig gegevens bekend, omdat in de oude Bangertse tuinen vrijwel uitsluitend het ras Fay's Prolific geteeld wordt. Dit ras verdraagt een vrij dichte beschaduwing zeer goed en is dus voor de Bangertse teelt bijzonder geschikt. Versailles Rouge, een ras dat in vele oude tuinen vermengd met Fay's Prolific voorkomt en dat van dit ras alleen is te onderscheiden door de lichtere kleur van de bloembodem, is eveneens zeer vatbaar. Op een oud bedrijf te Schellinkhout werden twee door lepelblad aangetaste struiken waargenomen van het ras Jonkheer van Tets. Van de overige rode besserassen zijn schrijver geen gegevens bekend. Wel werden in entproeven ook op het ras Laxton's Perfection lepelbladsymptomen verkregen.

4. *Waarnemingen betreffende zwarte bes en kruisbes*

Zoals op blz. 14 werd vermeld kon het virus uit een lepelbladzieke rode bes door middel van enting op zwarte bes worden overgebracht. Het blijkt zich in deze proeven slechts langzaam door de gehele struik te verspreiden. In verscheidene Bangertse tuinen vindt men zwarte bessen, verspreid tussen de rode bessen. Op deze zwarte bessen werden nimmer verschijnselen gevonden, die ook maar enigszins geleken op de bij de entproeven verkregen symptomen.

Op vele oude Bangertse bedrijven kweekt men tussen de rode bessen vrij veel

kruisbessen. Op één bedrijf werden aan enkele dezer struiken afwijkingen gevonden, waarbij o.a. de vruchten slecht afrijpten en een onregelmatige vorm kregen. Deze afwijking is vrij uitvoerig beschreven door HOUTMAN (1951). Uit één van deze struiken werd een virus geïsoleerd, dat zeer veel overeenkomst vertoont met de van lepelbladzieke rode bessen verkregen virusisolaties. Dit virus kon niet worden verkregen uit gezonde struiken en evenmin uit kruisbessastruiken met andere afwijkingen. Het is nog niet gelukt om het virus door middel van sapinoculatie weer op kruisbes terug te brengen.

DISCUSSIE

Uit proeven blijkt dat het virus, dat het lepelblad bij rode bes veroorzaakt, door middel van sapinoculatie kan worden overgebracht op tabak en van daaruit weer op bes. Het feit dat met sap van lepelbladvrije struiken nimmer kringvlekken werden verkregen op tabak, maakt het zeer waarschijnlijk dat de op tabak verkregen kringvlekken ook inderdaad teweeggebracht worden door hetzelfde virus, dat op rode bes lepelblad veroorzaakt. Er werden geen aanwijzingen verkregen, dat twee viruscomponenten in het spel zijn, waarvan de één bontheid en de ander lepelblad in rode bes doet ontstaan. Mochten we deze veronderstelling niettemin wel willen maken, dan moeten we, gezien de proefresultaten, aannemen, dat de component, die op rode bes bont veroorzaakt, latent in tabak aanwezig kan zijn, op rode bes alleen bij gelijktijdige infectie met lepelblad zichtbaar is en enige tijd na de infectie weer verdwijnt. Of ook in gezonde planten de component bont latent aanwezig kan zijn of steeds aanwezig is, ofwel dat de twee virussen alleen gezamenlijk infectie kunnen veroorzaken, blijft dan een open vraag. Bij de laatste zienswijze zijn we weer dicht genaderd tot de opvatting van één virus. Schrijver is derhalve van mening, dat de beschreven bontheid een primair symptoom is van lepelblad, dat later, bij het verschijnen van de werkelijke lepelbladsymptomen, weer verdwijnt. Of deze bontheid steeds aan lepelblad voorafgaat is niet zeker, daar bij de entproeven niet alle planten eerst bont werden, en er ook bij veldwaarnemingen struiken werden gevonden, die in sommige takken lepelblad vertoonden, doch waarvan de overige takken niet bont waren. Dit al of niet samengaan van lepelblad met bontheid zou verklaard kunnen worden door aan te nemen dat er verschillende virusstammen in het spel zijn. Hiervoor pleiten eveneens de resultaten der sapisolatieproeven en de verschillen in hevigheid der lepelblad symptomen. De bij verschillende lepelbladzieke struiken waargenomen „veinbanding” zou in dit zelfde licht kunnen worden gezien. Het is echter ook mogelijk, dat het al of niet optreden van bontheid afhankelijk is van andere omstandigheden, zoals groeivoorwaarden, leeftijd van de struik en tijdstip van infectie. Wat dit laatste betreft is het opmerkelijk, dat in de entproeven, waarbij de infectie in juli plaats vond, bontheid alléén werd verkregen op de bladeren van het overjarige hout; in het veld, bij op natuurlijke wijze geïnfecteerde planten, werd bontheid slechts gevonden bij de bladeren der jonge scheuten, een categorie van bladeren die pas later in het groeiseizoen wordt gevormd. Oppervlakkig gezien wijst dit er op, dat de natuurlijke infectie na juli en misschien zelfs in het daaropvolgende vroege voorjaar heeft plaats gehad (de incubatietijd bij de sapinoculatieproeven op bes bedroeg nl. slechts 16 dagen). Het is echter ook zeer goed mogelijk dat de natuurlijke infectie een andere reactie teweegbrengt en een langere incubatietijd

behoeft dan kunstmatige infectie. Zo is bv. uit het onderzoek van FULTON (1940) bekend, dat bij verschillende virussen een ondergrondse infectie via de wortels een geheel ander verloop heeft dan een bovengrondse infectie.

VAN POETEREN (1926) wijst er op dat lepelblad bij rode bes veel overeenkomst vertoont met brandnetelblad of „reversion” van zwarte bes, een viruszieke die o.a. door LEES (1920) en AMOS & HATTON (1926) uitvoerig beschreven werd en die ook in Nederland algemeen bij zwarte bessen voorkomt. Er is inderdaad een zekere gelijkenis, o.a. wat betreft de reductie van het aantal nerven en van het aantal tanden in de bladrand. Uit ons onderzoek bleek echter duidelijk, dat lepelblad en brandnetelblad door twee verschillende virussen veroorzaakt worden. Door enting met materiaal van lepelbladzieke rode bes werd op zwarte bes nl. alleen een bontheid verkregen en geen brandnetelblad. Bovendien kon uit een dergelijke geënte zwarte bes weer kringvlekkenvirus worden geïsoleerd. Inoculatieproeven met sap van brandnetelbladzieke en van gezonde zwarte bessen op tabak gaven daarentegen in geen enkel geval symptomen.

Over de identiteit van het uit lepelbladzieke struiken verkregen virus kan nog niets positief vermeld worden. De symptomen op verschillende waardplanten, vooral op *N. rustica* en op tabak, gelijken veel op die van een virus, dat door HILDEBRAND uit rode bessen werd geïsoleerd (HILDEBRAND, 1942). Als enig symptoom op bes vermeldt HILDEBRAND „zonate chlorotic spots” op enkele planten, die in een kas bij een temperatuur van 70° tot 80° groeiden en die tevens met „currant mosaic” (HILDEBRAND, 1939) waren geïnfecteerd. Deze symptomen, waarvan HILDEBRAND (1942) ook een foto geeft, doen sterk denken aan de door ons in de entproeven verkregen bontheid op de bladeren van het vruchthout. Op buiten groeiende planten nam HILDEBRAND nooit een dergelijke bontheid waar. Uit het feit, dat het virus niet uit alle met currant mosaic geïnfecteerde planten kon worden geïsoleerd leidt HILDEBRAND af dat currant mosaic en het door hem op tabak geïsoleerde virus twee verschillende virussen zijn, doch het gelukte hem niet om op tabak een virus te isoleren uit struiken, die niet met currant mosaic geïnfecteerd waren (HILDEBRAND, 1941 en 1944). Hij slaagde er evenmin in het virus door middel van sap terug te brengen op bes en komt voorts door vergelijkende waardplantenproeven tot de conclusie, dat zijn virus vrijwel identiek is met het tomato ringpot virus (HOLMES, 1939). KLESSER (1951), die eveneens een kringvlekkenvirus isoleerde uit rode bessen, en wel uit van oorsprong Nederlandse struiken, vereenzelvigd al of niet opzettelijk in haar „introduction” het door HILDEBRAND beschreven kringvlekkenvirus met diens currant mosaic. Zij komt door vergelijking met andere kringvlekkenvirussen tot de conclusie, dat het door haar gevonden virus een ander is dan de tot dan toe beschreven kringvlekkenvirussen. Ook de symptomen die KLESSER verkrijgt, o.a. op tabak en tomaat, vertonen een vrij sterke gelijkenis met de door ons verkregen symptomen op deze waardplanten. Er zijn echter ook duidelijke verschillen aan te wijzen. Zo verkrijgt KLESSER op *N. rustica* geen lokale symptomen. Op *N. rustica* neemt zij dezelfde spreidsymptomen waar als op *N. tabacum* en zij vermeldt van tomaat geen necrose en chlorose als spreidsymptoom. De door haar beschreven verschijnselen op „naturally infected plants” komen vrij goed overeen met de door ons waargenomen, aan lepelblad voorafgaande, bontheid. KLESSER slaagde er in het virus van tabak door middel van sapinoculatie terug te brengen op bes, echter alleen wanneer zij werkte met jonge in een kas groeiende zaailingen. Hoewel de gepubliceerde foto van één

dezer zaailingen vrij onduidelijk is, komt de beschrijving der symptomen goed overeen met de door ons in sapinoculatieproeven op bes verkregen verschijnselen. Ook wat betreft het later weer verdwijnen van de symptomen is er overeenstemming. KLESSER vermeldt evenmin als HILDEBRAND iets over lepelblad-symptomen. In zijn laatste publikatie, waarin hij de resultaten vermeldt van entproeven betreffende de gevoeligheid van een aantal bessersassen voor currant mosaic, vermeldt HILDEBRAND (1944) echter „a peculiar crinkle symptom” voor verschillende rassen. Ofschoon deze korte aanduiding moeilijk te beoordelen is, doet zij enigszins denken aan de ernstigste vorm van lepelblad.

Hoewel uit het voorgaande blijkt, dat er een zekere overeenkomst bestaat tussen de door KLESSER en HILDEBRAND beschreven virussen en het door ons geïsoleerde virus is het nog te vroeg om een definitief oordeel te geven betreffende verwantschap van deze virussen. Hiertoe is verder, indien mogelijk, vergelijkend onderzoek nodig, bv. langs serologische en elektronenmicroscopische weg. Hetzelfde geldt voor een mogelijke verwantschap tussen deze uit bes geïsoleerde virussen en enkele andere recent beschreven virussen, die eveneens op tabak kringvlekken veroorzaken. Dergelijke virussen werden onder meer uit framboos (CADMAN, 1956) en uit kers (KUNZE, 1958; PFAELTZER, 1959) geïsoleerd.

SAMENVATTING

In het fruitteeltgebied „de Bangert” komt al sinds 1920 bij rode bessen een virusziekte voor, die bekend is onder de naam „lepelblad”. Lepelbladzieke struiken worden gekenmerkt door bladmisvormingen, waarbij de insnijdingen tussen de bladlobben soms vrijwel verdwijnen en het aantal tanden in de bladrand sterk vermindert. De bladrand is bovendien veelal naar beneden omgebogen, waardoor het blad de vorm krijgt van een omgekeerde lepel. Lepelblad kan door enten worden overgebracht van zieke op gezonde rode bessen. Op zwarte bes, geënt met materiaal van lepelbladzieke rode bes, werd in enkele gevallen een bontheid verkregen doch geen lepelblad. Uit de beschreven proeven blijkt, dat lepelblad van rode bes en brandnetelblad van zwarte bes – hoewel er een zekere overeenkomst bestaat tussen de symptomen – veroorzaakt worden door twee geheel verschillende virussen. Uit lepelbladzieke struiken werd door middel van sapinoculatie een virus geïsoleerd, dat op tabak kringvlekken veroorzaakt. Inoculaties met sap uit lepelbladvrije struiken had nooit een dergelijke reactie ten gevolge. Met sap van kringvlekken vertonende tabak kon op bes weer lepelblad worden teweeggebracht.

Zowel bij sommige geënte struiken als in de sapinoculatieproef werd lepelblad voorafgegaan door een bontheid, die na het verschijnen van de lepelbladsymptomen weer verdween. Uit veldwaarnemingen bleek, dat ook bij natuurlijke infectie deze bontheid vaak voorafgaat aan lepelblad. Aangenomen wordt, dat genoemde bontheid een primair symptoom is van lepelblad en dat beide door hetzelfde virus worden veroorzaakt. In verschillende gevallen kon worden vastgesteld, dat lepelblad verspreid wordt door gebruik van ziek plantmateriaal. Aannemende dat de beschreven bontheid een eerste symptoom is van lepelblad, kunnen wij echter aan de hand van het voorkomen van die bontheid in besseaanplanten vaststellen, dat er ook verspreiding plaats heeft door het optreden van nieuwe infecties. In een geheel in kaart gebrachte aanplant werd een duidelijke haardvorming geconstateerd, hetgeen zou kunnen wijzen op een zich

langzaam binnen de aanplant verspreidende, mogelijk ongevleugelde overbrenger. In proeven met planten in besmette grond werd nog geen infectie verkregen.

Het op tabak geïsoleerde virus vertoont in sommige opzichten een vrij sterke gelijkenis met door HILDEBRAND (1942) en KLESSER (1951) uit rode bes geïsoleerde virussen. Er is echter nog niet genoeg vergelijkend onderzoek verricht om onze isolaties en die van genoemde onderzoekers als identiek te beschouwen. Ook een eventuele verwantschap met andere recent beschreven virussen, die op tabak kringvlekken veroorzaken en die o.m. werden geïsoleerd uit framboos (CADMAN, 1957) en kers (KUNZE, 1958; PFAELTZER, 1959) dient nader te worden onderzocht.

SUMMARY

Spoon leaf is a virus disease in red currants which occurs abundantly in the old fruit-growing centre of "De Bangert" in the province of North-Holland, and is practically restricted to this area. Although the type of soil in "De Bangert" varies considerably within short distances, light clay soils are predominant.

The disease was first described by MAARSE (1926) and by VAN POETEREN (1926).

A characteristic symptom is leaf deformation, the leaves sometimes being almost round, with no teeth in the margin which itself is often curled downward in a spoonlike fashion. VAN POETEREN (1926) mentions the fact that the symptoms of spoon leaf in red currants resemble to some extent those of "reversion" in black currants. Our experiments, however, show clearly that these diseases are caused by different viruses.

By means of sap inoculation a virus of the ring spot type could be transmitted from spoon leaf diseased red currants to tobacco and other herbaceous hosts. In one of the experiments the virus could be brought back into currant by sap inoculation. In some grafted plants, as well as in the sap inoculation experiment, the spoon leaf symptoms were preceded by a mosaic which disappeared when the spoon leaf symptoms developed. Also in naturally infected plants, mosaic is often found before the spoon leaves appear. It seems likely that the mosaic is a primary symptom of spoon leaf, and that both symptoms are caused by the same virus. In some plantations it was observed that the virus was distributed by the use of diseased plant material. However, considering the described mosaic as a primary symptom of spoon leaf, it is clear that in the "De Bangert" area new infections also take place. A mapped plantation, containing 2500 red currant bushes, showed an accumulation of diseased plants which might be attributed to a slowly spreading wingless vector. Results of experiments with red currant seedlings in soil from the vicinity of diseased plants, did not yet prove soil transmission of the virus. The symptoms of the red currant virus in tobacco show similarity to those caused by viruses which were isolated from red currant by HILDEBRAND (1942) and KLESSER (1953). However, more comparative research is needed to conclude that those viruses are identical with the virus causing spoon leaf. It is not yet possible either to answer the question whether there is any relationship between these currant viruses and other recently described viruses, such as those isolated from raspberry (CADMAN, 1957) and from cherry (KUNZE, 1958; PFAELTZER, 1959).

LITERATUUR

- AMOS, J. & R. G. HATTON, – 1927. Reversion in black currants. I. Symptoms and diagnosis of the disease. *J. Pomol. and hort. Sci.* 6: 167–183.
- CADMAN, C. H., – 1951. Studies in *Rubus* virus diseases. I. A latent virus of Norfolk Giant raspberry. *Ann. appl. Biol.* 38: 801–811.
- CADMAN, C. H., – 1956. Studies on the etiology and mode of spread of Scottish raspberry leaf curl disease. *J. hort. Sci.* 31: 111–118.
- FULTON, R. W., – 1941. The behaviour of certain viruses in plant roots. *Phytopath.* 31: 575–598.
- HILDEBRAND, E. M., – 1939. Currant mosaic. *Phytopath.* 29: 369–371.
- HILDEBRAND, E. M., – 1941. Mechanical transmission from currant to tobacco of a virus identified as *Annulus zonatus*. (Abstr.) *Phytopath.* 31: 11.
- HILDEBRAND, E. M., – 1942. Tomato ringspot on currant. *Am. J. Bot.* 29: 362–366.
- HILDEBRAND, E. M. & P. V. WEBER, – 1944. Varietal susceptibility of currants to the cane blight organism, and to currant mosaic virus. *Pl. Dis. Rep.* 28: 1031–1035.
- HOLMES, F. O., – 1939. Handbook of phytopathogenic viruses. Minneapolis.
- HOUTMAN, G., – 1951. Het verlopen van kruisbessenstruiken. *De Fruitteelt* 41: 720–721.
- HUS, P., – 1944. *Tuinbouwgids 1944*. Den Haag.
- IGNATIUS, J. G. W., – 1943. Overzicht van de Nederlandse tuinbouw. *Meded. Tuinb. Voorl. Dienst* no. 37: 13.
- KATWIJK, W. VAN, – 1952. Enkele afwijkingen bij rode en zwarte bessen en kruisbessen. *De Fruitteelt* 42: 278.
- KATWIJK, W. VAN, – 1953. Virusziekten in de vruchtboomkwekerij. *Versl. en Meded. Plantenziektenk. Dienst* no. 119: 24.
- KLESSER, P. J., – 1951. A virus disease of red currant. *Ann. appl. Biol.* 38: 707–713.
- KUNZE, L., – 1958. Ein Virus der Tabak-Ringflecken-Gruppe von Süßkirschen. *Phytopath. Z.* 31: 279–288.
- LEES, A. H., – 1920. A method of identifying reversion of black currants. *A.R. agr. and hort. Res. Sta. Long Ashton* 1920: 66.
- MAARSE, J. (= M. te S.), – 1926. Een nieuwe afwijking in de Fay's Prolific en een raadgeving aan kwekers en telers. *Floralia* 41: 473.
- PFAELTZER, H. J., – 1959. Onderzoekingen over de rozetziekte van de kers. *T. Pl.-ziekten* 65: 5–12.
- POETEREN, N. VAN, – 1926. Aalbes. Lepelvormige bladeren. *Versl. Plantenziektenk. Dienst* over het jaar 1925: 32–33.
- RIETSEMA, I., – 1943. Vijfde beschrijvende rassenlijst voor fruitgewassen Wageningen p. 16.
- SPRENGER, A. M. – 1948. *Leerboek der fruitteelt*. Zwolle.