

ruimten verwijderen en ontsmetten. Ontsmetting van ruimte en voorraden kan geschieden door verhitting gedurende eenige dagen tot ca. 55 °C., of door begassing met „Zyklon” of „T-Gas”, terwijl in geval van nood ook zwaveldioxyd aangewend kan worden, hoewel dit vele onaangename nevenwerkingen uitoefent en ook minder sterk doordringt.

Ledige ruimten kunnen met spuitmiddelen behandeld worden. Hiervoor komen in aanmerking ammoniak, 5 % opl. van xantho-geenzure kali of petroleum. Van de handelspreparaten zijn „SZ” en „Durafix” werkzaam gebleken.

Kunstmatig drogen van granen, die door hun vochtigheid gevaar loopen door mijten aangetast te worden, verdient aanbeveling. Zaai-graan kan door vermenging met 1 : 1000 „Globol” (= paradichloorbenzene, B.J.H.) binnen 24 uur van mijten gezuiverd worden.

Daar, als reeds gezegd, mijterig voedsel ziekten te weeg kan brengen, mag ook na het doden der mijten het voedsel slechts gemengd met gezond voedsel in de verhouding 1 : 2 worden verstrekt.

B. J. HERMANS

RECTIFICATIE

In het artikel getiteld: De toepassing van een beschuttende enting als middel ter bestrijding van virusziekten bij de aardappelplant, van Dr J. Oortwijn Botjes, opgenomen in de 6e aflevering van den jaargang 1940, komen twee drukfouten voor, die hersteld moeten worden, t.w.:

op blz. 186, regel 21 van onder staat: overgevoeligheid. Dit moet zijn: ongevoeligheid;

op blz. 191 wordt als datum van inzending aangegeven: September 1940. Dit moet zijn: Januari 1940.