

SUMMARY

The authors describe the isolation of cyclic phosphoric esters from the complex mixture produced by the treatment of certain glycols with polyphosphoric acid, mixture which contains in larger amounts hydroxyalkylphosphoric esters. In this way, trimethylenephosphoric acid (yield 15,8%) and tetramethylenephosphoric acid (yield 0,3%) are easily obtained from the corresponding glycols.

Laboratoires de chimie organique et
pharmaceutique de l'Université de Genève

Errata

Helv. **37**, 1078 (1954), Abhandlung Nr. 130 von ROGER G. BATES & G. SCHWARZENBACH. In Tabelle 2, mittlerer Teil, wo die Messungen am m-Nitroanilinium-Ion angegeben sind, sind die Zahlen in den Kolonnen log V und pK' durch folgende Werte zu ersetzen:

c	=	0,1	0,06	0,04	0,00
log V	=	0,197	0,211	0,218	0,228
pK'	=	2,528	2,513	2,506	2,496

Dies führt zu den thermodynamischen Konstanten $pK = 2,49_5$ (25°C)

Helv. **42**, 2379 et 2394 (1959), mémoires nos 257 et 258 de P. LÄUGER†, M. PROST & R. CHARLIER. La note ¹⁾ est à supprimer; ces mémoires ont pu être publiés parce qu'un des auteurs est suisse.
