

STICHTING
MATHEMATISCH CENTRUM
2e BOERHAAVESTRAAT 49
AMSTERDAM

Publicatie

99

—

Sur un problème de M. Karamata

D. van Dantzig



1955

SUR UN PROBLÈME DE M. KARAMATA

PAR

D. VAN DANTZIG
(Amsterdam)

1. Récemment M. J. KARAMATA à Genève me posait le problème suivant:

Soit a_1, a_2, \dots une suite de nombres réels, telle que
1° pour chaque entier $n \geq 1$

$$|a_{n+1} - a_n| \leq n^{-1} \quad (1)$$

2° pour chaque entier $N \geq 1$

$$|\sum_1^N n^{-1} a_n| \leq 1 \quad (2)$$

Est-ce qu'il existe alors un nombre réel $\varrho > 1$, et une suite d'entiers n_k avec

1° pour chaque entier $k \geq 1$

$$1 < n_k < n_{k+1} \leq \varrho n_k \quad (3)$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = 0 \quad (4)$$

Nous démontrerons que la réponse à ce problème doit être négative, en donnant un contre-exemple.

2. Soit $f(x)$ une fonction réelle et continue pour $x \geq 0$, telle que
1° pour tous les $x > 0, y > 0$

$$|f(x) - f(y)| \leq |x - y| \quad (5)$$

2° pour tous les $\xi > 0$

$$|\int_0^\xi f(x) dx| \leq 1 \quad (6)$$

Est-ce qu'il existe un nombre réel $\gamma > 0$ et une suite croissante de nombres réels et positifs $0 < \xi_1 < \xi_2 < \dots$, telle que $\xi_n \rightarrow \infty$ pour $n \rightarrow \infty$, et

$$1^\circ \quad \lim_{n \rightarrow \infty} f(\xi_n) = 0 \quad (7)$$

2° pour chaque n

$$\xi_{n+1} - \xi_n \leq \gamma \quad (8)$$

Nous démontrerons que la réponse à cette question aussi doit être négative, en donnant un contre-exemple, duquel nous déduirons celui qui contredit l'assertion du problème de M. KARAMATA.

3. Pour un $c > 0$ ($c \leq 1$) arbitraire nous définissons la fonction (fig. 1)




Fig. 1

$$\varphi(c, x) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} x & \text{si } |x| \leq c \\ c \operatorname{sgn} x & \text{si } c \leq |x| \leq c^{-1} \\ (c + c^{-1} - x) \operatorname{sgn} x & \text{si } c^{-1} \leq |x| \leq c + c^{-1} \\ 0 & \text{si } |x| \geq c + c^{-1} \end{cases} \quad (9)$$

où

$$\operatorname{sgn} x \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} 1 & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \\ -1 & \text{si } x < 0 \end{cases} \quad (10)$$

et nous posons pour un $k \geq 0$ entier

$$\varphi_k(x) \stackrel{\text{def}}{=} \varphi(2^{-k}, x) \quad (11)$$

Evidemment on a pour tous les x et y réels et tous les $c > 0$

$$|\varphi(c, y) - \varphi(c, x)| \leq |y - x| \quad (12)$$

et

$$|\int_x^y \varphi(c, z) dz| \leq 1 \quad (13)$$

tandis que $\varphi_k(x)$ n'est différente de zéro que sur un intervalle de longueur

$$l_k \stackrel{\text{def}}{=} 2(2^{-k} + 2^k) \quad (14)$$

Soit maintenant $r_0, r_1, r_2, r_3, \dots$ une suite de nombres naturels (entiers ≥ 0), qui contient chaque nombre naturel une infinité de fois. Par exemple: $r_0 = 0, r_1 = 0, r_2 = 1, r_3 = 0, r_4 = 1, r_5 = 2, \dots$

généralement $r_h = m$ si $h = \frac{1}{2}n(n-1) + m$ pour un entier $n \geq 1$ et $0 \leq m \leq n-1$. Posons maintenant pour chaque h naturel

$$L_h \stackrel{\text{def}}{=} \sum_0^{h-1} l_{r_j} \quad (15)$$

$$\Psi_h(x) \stackrel{\text{def}}{=} -\varphi_{r_h}(x - L_h - \frac{1}{2}l_{r_h}) \quad (16)$$

$$f(x) \stackrel{\text{def}}{=} \sum_0^{\infty} \Psi_h(x) \quad (17)$$

Autrement dit, la fonction $f(x)$ est obtenue par superposition des fonctions $\varphi_{r_0}(x)$, $\varphi_{r_1}(x)$, $\varphi_{r_2}(x)$, ..., translatées tellement que leurs parties non-nulles soient juxtaposées (fig. 2, où l'échelle sur l'axe des x est raccourcie).

Evidemment cette fonction $f(x)$, définie par (17), satisfait aux conditions (5), (6).




Fig. 2

Supposons maintenant qu'il existe des nombres $\gamma, \xi_1, \xi_2, \dots$, satisfaisant à (8). Choisissons un entier $k \geq 1$ tel que $2^k \geq 2\gamma$, et mettons $a = 2^{-k}$. Etant donné un entier $n_0 > 0$ arbitraire, il existe un h avec $L_h \geq \xi_{n_0}$, et un $r_j = k$ avec $j \geq h$. Alors Ψ_j prend la valeur $2^{-r_j} = 2^{-k} = a$ sur un intervalle de longueur $2^k - 2^{-k} \geq 2^{k-1} \geq \gamma$. Mais à cause de (8) et $\xi_n \rightarrow \infty$ pour $n \rightarrow \infty$ cet intervalle doit contenir au moins un ξ_n avec $n \geq n_0$. Donc pour chaque n_0 il existe un $n \geq n_0$ avec

$$f(\xi_n) = a > 0,$$

c.à.d. il y a une infinité de tels n , de même que (7) ne peut pas être vrai, ce qui contredit l'assertion du problème posé.

4. Revenons maintenant au problème de M. KARAMATA.

Soit $f(x)$ la fonction définie ci-dessus (fig. 2), et posons pour chaque entier $n \geq 1$ avec un c positif et $c < 1$

$$a_n \stackrel{\text{def}}{=} cf(\ln n) \quad (18)$$

Alors, à cause de (5) pour chaque $n \geq 1$

$$\begin{aligned} |a_{n+1} - a_n| &= c|f(\ln(n+1)) - f(\ln n)| \leq \\ &\leq c(\ln(n+1) - \ln n) \leq cn^{-1} < n^{-1}, \end{aligned}$$

c.à.d. (1).

D'ailleurs pour un entier $n \geq 1$ quelconque

$$\begin{aligned} &| \int_{\ln n}^{\ln(n+1)} f(x) dx - n^{-1} f(\ln n) | \leq \\ &\leq \ln(1 + n^{-1}) \cdot \max_{\ln n \leq x \leq \ln(n+1)} |f(x) - f(\ln n)| + \quad (19) \\ &+ |f(\ln n)| |n^{-1} - \ln(1 + n^{-1})| \leq 3 \cdot (2n^2)^{-1} \end{aligned}$$

puisque pour $n \leq e^x \leq n+1$

$$|f(x) - f(\ln n)| \leq |x - \ln n| \leq \ln(1 + n^{-1}) < n^{-1},$$

tandis que $|f(x)| \leq 1$ pour chaque x et $n^{-1} - \ln(1 + n^{-1}) \leq \frac{1}{2}n^{-2}$ pour $n \geq 1$.

Il s'ensuit que pour un entier $N > 1$ quelconque

$$|c \int_0^{\ln N} f(x) dx - \sum_1^{N-1} n^{-1} a_n| \leq \frac{3}{2}c \sum_1^{N-1} n^{-2} < \frac{1}{4}\pi^2 c \quad (20)$$

donc, à cause de (6)

$$|\sum_1^N n^{-1} a_n| \leq (\frac{1}{4}\pi^2 + 1)c \leq 1 \quad (21)$$

si nous choisissons $c \leq (\frac{1}{4}\pi^2 + 1)^{-1}$ (Même des valeurs de c plus grands suffiraient).

D'autre part, si

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 \quad (22)$$

donc $f(\ln n_\nu) \rightarrow 0$, nous avons vu qu'il existe une infinité de valeurs de ν pour lesquelles $\ln n_{\nu+1} - \ln n_\nu$, donc aussi $n_\nu^{-1} n_{\nu+1}$ surpassent un nombre arbitrairement donné. Ceci démontre que le problème de M. KARAMATA doit être répondu au sens négatif.

(Reçu le 13 Octobre, 1954)